

35. *Formica (s. str.) truncorum* F.

Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1600–1750 m, 10. VII. 1966, am Talgrund (Nr. 514). — 1 ♀.

Verbreitung: Mittel- Nord- und Osteuropa, Sibirien, Mongolei und mittelasiatisches Gebirge.

36. *Formica (s. str.) pratensis* RETZ.

Chovd aimak: 3 km N von Somon Uenč, im Tal des Flusses Uenč gol, 1450 m, 2.–3. VII. 1966, am Talgrund neben dem Bach (Nr. 614, 619). — 10 ♀♀, 1 ♀.

Verbreitung: Europa, Südsibirien und mittelasiatisches Gebirge.

37. *Formica (s. str.) lugubris* ZETT.

Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1880–2000 m, auf Erlen und Birken (Nr. 498a, 508); 130 km N von Ulan-Baator, 1450 m, 9. VII. 1963, an der Landstraße neben dem 130. Kilometerstein an einer üppigen mesophilen Wiese (Nr. 110). — 40 ♀♀.

Verbreitung: Sibirien, Nordeuropa und südeuropäische Gebirge.

38. *Formica (s. str.) polycтена* FOERST.

Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500 m, 12. VI. 1964, von neben dem Bach stehenden Bäumen (Nr. 122); Songino, 24 km SW von Ulan-Baator, 1300 m, 7. VII. 1966, am Ufer des Flusses Tola (Nr. 506). — Suche baator aimak: 44 km SSW von Baruun urt, 1050 m, 2.–3. VIII. 1966, trockene Gebirgs-Steppe, in einem tiefen Wasserriß mit Ulmus-Bäumen und Sorbus-Gebüsch, an den flachen Stellen mit Artemisia, an den Abhängen mit Federgras (Nr. 349). — 2 ♀♀, 1 ♂.

Verbreitung: Europa und Sibirien.

39. *Formica (Raptiformica) sanguinea* LATR.

Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1500–2000 m, Tal mit einem Bach, zweiseitig mit steilen Berghängen, an der nördlichen Seite Nadelwald, neben dem Bach mit Birkenbäumen, die Südseite ist eine trockene, steinige Steppe (Nr. 297a, 298, 494, 495, 508); SO von Somon Bajanzogt, 1600 m, 11. VI. 1966, am Waldrand (Nr. 520a, 520b). — Chentej aimak: 150 km ONO von Öndörchaan, 10 km S vom Fluß Kerulen und 10 km N von Somon Tumunzogt, 1000 m, 30. VII. 1965, Gebirgs-Steppe mit sehr üppiger Vegetation, breites Tal von niedrigen Bergen umgeben, nördlich vom Lager ein kleiner Waldfleck (Nr. 331). — Suche baator aimak: 25 km N von Somon Bajanterem, 950 m, 1.–2. VIII. 1965, abflußloses, flaches Salzbecken (Nr. 344). — Čojbalsan aimak: 15 km N von Somon Galuut, 850 m, 17. VIII. 1965, breites Tal mit blumenreicher Wiese (Nr. 433). — Weit über 100 ♀♀.

Verbreitung: Palaearktis.

40. *Formica (Coptoformica) brunneonotida* DL.

Central aimak: Lager am Fluß Kerulen, 45 km O von Somon Bajandelger, 1340 m, 26. VII. 1965, an einer sehr steinigen öden, südlichen Bergsteppe (Nr. 304). — Chentej aimak: 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 21. VIII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, an den Hängen mit Amygdalus-Gebüsch (Nr. 459); 10 km W von