

Somon Delgerchaan, 1520 m, 24. VIII. 1965, an den südwestlichen Ausläufern der Berge von Bajan Ulaan ul, zwischen flachen Hügeln, an trockener Federgras-Steppe (Nr. 476). — *Suchebaator aimak*: 44 km SSW von Somon Baruun urt, 1050 m, 2.–3. VIII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, in einem tiefen Wasserriß mit Ulmus-Bäumen und Sorbus-Gebüsch, an den Abhängen mit Federgras, an den flachen Stellen mit Artemisia (Nr. 349); Fluß Bajan gol, 85 km NO von Somon Dariganga, 1100 m, 8. VIII. 1965, schmales, feuchtes Tal, von steinigem Basalthängen umgrenzt, im Tal mit sehr üppiger Vegetation (Typha, Phragmites, Carex, Juncus etc.) (Nr. 377). — *Čojbalsan aimak*: 50 km SO von Čojbalsan, 700 m, 15. VIII. 1965, hügelige Steppe, in den Tälern mit üppiger Vegetation, am Hügelrücken Federgras (Nr. 421); 15 km N von Somon Galuut, 850 m, 17. VIII. 1965, breites Tal mit blumenreicher Wiese (Nr. 433). — 40 ♂ ♀.

Verbreitung: Südsibirien, Mongolei, Tibet.

#### 41. *Formica (Coptoformica) pisarskij* DL.

*Central aimak*: Zuun-Chara, 850 m, 8. VII. 1964, an Feldern von Kulturpflanzen und Unkraut (Nr. 281); Lager am Fluß Kerulen, 45 km O von Somon Bajan-delger, 1340 m, 26. VII. 1965, sehr steinige, öde Bergsteppe (Nr. 304); Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 1880–2000 m, 9. VI. 1966 (Nr. 509); ca. 30 km O von Somon Nalajch, 1530 m, 14. VI. 1966, am feuchten Talgrund sowie an den trockeneren, kahlen Berghängen bis zum Waldrand (Nr. 523); 13 km W von Somon Bajanzogt, 1450 m, 17. VI. 1966, typische Caragana-Steppe (Nr. 527); Ulaan chodag, 16 km S von Somon Öndörschireet, 1500 m, 24. VII. 1966, Gebirgssteppe an einem nördlich exponierten Berghang (Nr. 739). — *Chentej aimak*: zwischen Somon Zenchermandal und Somon Žargaltchaan, 10 km O von Zenchermandal, 1400 m, 27.–28. VII. 1965, Bergsteppe mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 311); Čandagan tal, 40 km O von Žargaltchaan, 1300 m, 28. VII. 1965, Federgras-Steppe (Nr. 316); 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28. VII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, an den Hängen mit Amygdalus-Gebüsch (Nr. 319, 323). — *Suchebaator aimak*: 44 km SSW von Baruun urt, 1050 m, 2.–3. VIII. 1965, trockene Gebirgs-Steppe, in einem tiefen Wasserriß mit Ulmus-Bäumen und Sorbus-Gebüsch, an den Abhängen mit Federgras, an den flachen Stellen mit Artemisia (Nr. 349, 351); 15 km N von Somon Erdenezagan, 950 m, 8. VIII. 1965, sehr trockene Federgras-Steppe (Nr. 380). — *Archangaj aimak*: Changaj Gebirge, zwischen Somon Ichtamir und Somon Čuluut, ca. 20 km W von Somon Ichtamir, 3 km S vom Tal des Flusses Chanuj gol, 2150 m, 20. VI. 1966, typische Hochgebirgssteppe mit Nadelwäldern und im Tal mit sehr üppiger Vegetation, blühende Trollius-Wiesen (Nr. 547); Changaj Gebirge, 8 km W von Somon Urdtamir, 1620 m, 19. VI. 1966, an den trockenen Bergsteppen und in einem Wasserriß (Nr. 538). — *Bajan chongor aimak*: Changaj Gebirge, Ulaan čolon, 18 km S von dem Paß Egijn davaa, 2300 m, 21. VI. 1966, im Tal neben dem Bach, an einer steinig, kahlen Bergsteppe (Nr. 552, 711). — *Chovd aimak*: Mongol Altaj Gebirge, ca. 45 km S von Somon Manchan, 2100 m, 9. VII. 1966, im Engtal, an den steilen Berghängen und Felsen blühende Caragana (Nr. 657). — Weit über 100 ♂ ♀.

Verbreitung: Ostsibirien, Mongolei.

#### 42. *Formica (Coptoformica) longiceps* DL.

*Central aimak*: SO von Somon Bajanzogt, 1600 m, 11. VI. 1966, am Waldrand vom blühenden Gesträuch (Weiden und Birken) (Nr. 519). — *Archangaj aimak*: