

les angles sont vifs et la forme générale varie plus nettement du rectangle au trapèze. La couleur et la forme du pétiole et du postpétiole ne sont donc pas des caractères utilisables pour séparer les espèces. Les caractères de la chétotaxie sont plus intéressants mais ils ne sont pas toujours sûrs en raison du frottement possible des téguments et parfois, de l'existence de poils surnuméraires. Ces derniers s'observent chez les pseudogynes reconnaissables à d'autres caractères (caractères thoraciques) et il ne s'agit pas alors d'une véritable exception mais plutôt de la confirmation d'un déterminisme génétique. Chez la femelle en effet, apparaissent en général 2 poils de plus que chez l'ouvrière ; ils s'intercalent l'un au bord interne de l'œil et l'autre plus en arrière, entre le poil post-oculaire et le poil occipital. Le pseudogyne que j'ai eu en main présente cette disposition. Le poil proche de l'œil, chez l'ouvrière est situé au côté interne de celui-ci chez *O. balzani* ; il est situé en avant chez

Tableau I  
Caractères différentiels des ouvrières.

	<i>O. balzani</i>	<i>O. betschi</i>	<i>O. stenognatha</i>
Front	déprimé	déprimé	convexe
Vertex	convexe	déprimé	convexe
Distance angle-occipital, angle postéro-oculaire	égale distance, angle post.-ocul., angle ant.-ocul.	inférieure distance angle postéro-oculaire, angle antéro-oculaire	
Nombre de poils spatulés claviformes sur la tête	10	12	14
Rebord orbitaire	+	++	+
Dents mandibulaires	aiguës, longues	en pointe mousse épaulée par un denticule	1 à 3 denticules entre dents intermédiaires
Dent mandibulaire basale	en lame	en lame	en pointe
Propodeum	pas de lame	lame propodéale bien développée	pas de lame

Tableau II  
Caractères particuliers aux femelles.

	<i>O. balzani</i>	<i>O. betschi</i>	<i>O. stenognatha</i>
Pronotum	arrondi en avant, sans épaules	épaules saillantes	arrondi en avant sans épaules
Nombre de poils spatulés claviformes sur la tête	14	16	18