

<i>Sciomyzides.</i>	
<i>Dryomyza</i> sp.?	<i>staceo subviriscentibus, oculis magnis, nitidis, nigris; abdomine postice bilobo.</i>
<i>Opomyzides.</i>	<i>Long. 3$\frac{1}{2}$ l. — lat. abd. 2$\frac{1}{4}$ l.</i>
<i>Calobata cibaria?</i> L.	<i>Oestracides.</i>
<i>Orthalides.</i>	<i>Oestrus trompe</i> Modeer.
<i>Trypera continua</i> Meig.	<i>— tarandi</i> L.
<i>Scatomyzides.</i>	<i>Conopsides.</i>
<i>Cordylura haemorhoidalis</i> Meig.	<i>Myopa testacea</i> F.
<i>Dolichopodes.</i>	<i>— tessellatipennis</i> Motsch.
<i>Dolichopus ungulatus</i> L.	<i>Fusco-picea, nitida, abdomine fasciis cinereis tribus, ore frontisque pallide-testaceis, antennis rostro pedibusque plus minusve brunneis; alis dilute infuscato tessellatis, nervis nigro-piceis.</i>
— sp.?	<i>Long. 3$\frac{1}{4}$ l. — lat. thor. 1 l. exp. alar. 7 l.</i>
<i>Muscides.</i>	<i>Syrphides.</i>
<i>Anthomyza tabida</i> ..	<i>Paragus rufiventris</i> Motsch.
— <i>cunicularis</i> L	<i>— obscurus</i> Meig.
— sp.?	<i>Eristalis</i> sp.?
<i>Musca domestica</i> L.	<i>Sceaeva vitripennis</i> Meig.
<i>Exorista prominens</i> Meig.	<i>— arcuata</i> Fall.
<i>Erebia tremula</i> L.	<i>Syrphus floreus?</i> Fall.
<i>Sarcophaga albiceps</i> Meig.	— sp.?
<i>Phorocera pullata</i> ...	<i>Volvucella tabanoides</i> Motsch.
<i>Gonia microceps</i> Motsch.	<i>Magna, nigro-picea, fronte, ore, rostro, thoracis lateribus maculaque basali, scutello alarumque basi florotestaceis, abdomine dimidio antice albo-testaceo; alis fusco bifasciatis,</i>
<i>Tantum Gon. capita, sed capite minore, angustiore, abdominis lateribus postice testaceis.</i>	<i>Long. 6$\frac{3}{4}$ l. — lat. thor. 2$\frac{1}{3}$ l. — exp. alar. 18 l.</i>
<i>Rhyzomyzides.</i>	
<i>Trixa? nodifrons</i> Motsch.	
<i>Ocyptera borealis?</i> Zetterst.	
<i>Coriacées.</i>	
<i>Hippobosca oculata</i> Motsch.	
<i>Dilatata, depressa, fusco picea fronte, scutello femoribusque te-</i>	