

*que emarginato, medio lobum latum descendantem exhibens* (fig. 16).

— Spec. 1-4.

1. FORMICA MARGINATA Latr. *Fourm.* p. 103; Los. *Piem.* p. 313; Mayr *Austr.* p. 42.

*Operaria*: nigra parum nitidiuscula mandibulis, flagellis pedibusque rubido-rufescensibus (vel fusco-nigra mandibulis, flagellis thorace infra cum coxis, trochanteribus, femoribus, saltem ad partem, basique abdominis, vel adhuc capite postice et infra obscure rubido-rufescensibus); caput subtiliter coriaceum, clypeus margine antico (infero) obtuse angulatum emarginatus. — Long. 7-14 millim.

*Femina*: nigra nitida, mandibulis, flagellis et pedibus (interdum adhuc thorace et basi abdominis) rufescensibus; abdomen politum. Long. 11-14 millim.; ala ant. 10-13 millim. hyalina vel leviter lutescens, nervis (costis) et stigmate fuscis.

*Mas*: niger nitidus, flagellis antennarum, articulationibus pedum tarsisque obscure rufescensibus, squama humilis (latior quam alta) supra late emarginata; scapus tibiaeque absque omni fere pilositate; clypeus non carinatus, de cetero ut in operaria. — Long. 7-9 millim.

Habitat in Gallia meridionali passim; nidificans sub lapidibus. Etiam in Algeria, ubi magnitudinem *Formicæ ligniperdaæ* attingit eique colore saepe similis evadit, exceptis flagellis pallidis. Vix specie diversa.

Semblable au suivant, dont il ne diffère guère que par la coloration roussâtre des pattes. La variété de l'Algérie constitue, à mon avis, le *F. thoracica* Fabr. *Piez.*, p. 397 (*F. ligniperda* Luc. *Algér.* II, p. 302).

2. FORMICA AETHIOPS Latr. *Fourm.* p. 101; Los. *Piem.* p. 312; Lep. *Hymén.* I, p. 242; Mayr. *Austr.* p. 41; *F. migrata* Nyl. *Addit. alter.* p. 35.

*Operaria*: nigra nitidiuscula parce pilosa, mandibulis, articulationibus pedum tarsisque obscure rufescensibus, tibiis interdum quoque piceis æque ac antennis; abdomen nitidum. — Long. 6-9 millim.

*Femina*: nigra nitida articulationibus pedum et tarsis rufo-piceis; squama subquadrata. — Long. 8-9 millim.; ala ant. 9 millim. albo-hyalina nervis et stigmate dilute flavo-fuscescentibus.

*Mas*: totus niger, angustus, subnitidus; pedes pilosi; squama parva humilis superne concaviuscula. — Long. 6 millim.; ala ant. æqui-longa.

In Gallia meridionali rarius. Nidulans ut præcedens.