

observé en Autriche et en Italie, paraît être assez voisin de cette espèce, dont il se distingue par un abdomen velu et d'un gris soyeux; mais il est probable que ces deux espèces doivent être rapportées à un groupe distinct.

10. FORMICA TRUNCATA Spin. *Ins. Ligur.* I, p. 244; Duf. et Perr. *Ann. Soc. entom.* IX (1840), p. 49, t. 3, f. 52-55; Mayr. *Austr.* p. 47.

Operaria: obscure rufa, abdomen nitido nigro, caput antrorsum granulato-rugosum, antice truncatum, pars truncata lineis 3 longitudinalibus impressis, parallelis; squama emarginata.— Long. 5-6 millim.

Femina: obscure rufa nitida abdomen nigrum, segmento secundo fascia basali pallescente; caput antice truncatum; mandibulæ 4-dentatae; squama crassa emarginata.— Long. 7-8 millim.

« Hospitatur in ramis exsiccatis Rubi fruticosi, nec non in galla mespili-formi quercus » (Duf. et Perr., *l. c.*).

In Gallia meridionali.

La grosse tête tronquée distingue cette Fourmi de toutes ses congénères.

SUBDIVISIO 2.— *Species minoris vel mediæ magnitudinis. Operaria metanoto subrectangulari, metathorax postice abrupte truncatus. Alæ ut in subdivisione prima.* — Spec. 10.

11. FORMICA LATERALIS Oliv. *Encycl. Hist. nat.* VI, p. 497; Latr. *Fourm.* p. 172; Lepel. *Hym.* I, p. 217; Mayr. *Austr.* p. 50; *F. bicolor* Latr. *Ess. Fourm. Fr.* p. 43; *F. melanogaster* Latr. *Fourm.* p. 171; *F. axillaris* Spin. *Ins. Ligur.* I, p. 243; *F. atricolor* Nyl. *Addit. alter.* p. 36; *F. dalmatica* Nyl. *ibid.* p. 37 (alia forma); *F. foveolata* Mayr. *Beschreib. einig. n. Ameis.*

Operaria: nitida abdomen nigro vel piceo-nigro, cetero corpore piceo-nigro vel rufo; pedes subnudi; squama supra convexa.— Long. 3-6 millim.

Femina: nitida, caput rufo-rubens vel piceo-nigrum, thorax piceus, abdomen piceo-nigrum; metathorax postice truncatus, sed angulis rotundatis; squama subquadrata supra interdum leviter emarginata; alæ albo-hyalinæ nervis dilute pallidis.— Long. 9-10 millim.; ala ant. 9,5 millim.

Mas: niger nitidus pilosus, mandibulis, flagellis tarsisque obscure rufescensibus; metanotum breve postice convexe declive; tibiæ evidenter pilosæ.— Long. 6-7 millim.