

Habitat sub lapidibus in Gallia meridionali. In Algeria (Lucas, Roussel).

L'ouvrière de cette espèce est facile à reconnaître par le métanotum rectangulaire et tronqué. La coloration se distribue chez elle d'une manière très variable ; de là les nombreux synonymes appartenant à ses différentes modifications.

SUBDIVISIO 3.— *Formicæ majoris vel mediae magnitudinis. Nodus petiolaris crassus, abdomen operariæ saltem apicem versus compres-siusculum, thorax pone scutellum impressus. Femina et mas alis satis brevibus, nervis crassis, area discoidali integra vel nulla (fig. 2), hic ventre postice piloso, valvulis genitalium lateralibus angustis. Monocombus Mayr., Cataglyphis Foerst. — Spec. 12-13.*

12. FORMICA VIATICA Fabr. *Mant. Ins.* I, p. 308; Oliv. *En-oycl. Hist. nat.* VI, p. 495; Latr. *Fourm.*, p. 173; *F. bicolor* Fabr. *Ent. syst.* II, p. 351, ♂; Latr. *Fourm.* p. 119, id., *F. megalocola* Foerst. *Verh. d. naturh. Ver. d. Rheinl.* VII, p. 485; *Cataglyphis Fairmairei* Foerst., *ibid.*, ♂; *Monocombus viaticus* Mayr. *Austr.* p. 110.

Operaria : lète rufa subtilissime coriacea, opaca, antennæ, pedes et interdum petiolus plus minus fuscescentes, abdomen fusco-nigrum, caput thorace latius; venter nitidiusculus. — Long. 8-10-13 millim.

Femina : lète rufa, subtiliter coriacee-insculpta, abdomen fusco-nigrum; nodus petiolaris crassus, ut in operaria. — Long. 13 millim.; ala antica modo 10 millim., leviter versus costam et circa nervos infuscata, area discoidalis fere triangularis, parva, nervus costalis usque ad stigma pallidus.

Mas : rufus, pro- et mesothorace nigricantibus (mesonoto late rufo) abdomen segmentis convexiusculis, venter versus apicem pilis mollibus crebre obsitus. — Long. 10-11 millim.; ala ant. 9 millim.

In Algeria, locis aridis, velocissime currens. *Attæ capitatae* bellum gerit (vide infra sub hac specie observationes huc respicientes clarissimi Roussel (1) locis, ubi simul obveniunt.

Belle, grande espèce, l'abdomen d'un noir presque bronzé, le reste du corps

(1) « Le *Formica viatica* Fabr., dont l'existence semble, en Algérie, liée à celle de l'*Atta capitata* Fabr., vit dans les mêmes lieux. On le voit courir dans les chemins secs et après, et pendant la plus grande chaleur du soleil, avec une vélocité remarquable, en relevant son abdomen. » Rouss., mscrpt.