

d'un roux ferrugineux, la tête plus volumineuse que l'abdomen. L'élévation antérieure du corselet, de la même hauteur que l'élévation postérieure formée par le métanotum ; le corselet est proportionnellement plus long que dans l'espèce suivante.

13. FORMICA CURSOR Fonscol. *Ann. Soc. Ent.* 2, IV (1846), p. 41,
♀ ♀ ♂.

Operaria : nigra nitida subhænescens, sat nuda, mandibulis, antennis tarsisque rufescentibus ; area frontalis absque nitore ; squama petiolaris crassa supra obtusa ; abdomen (magis nitidum quam ceterum corpus) ventre compressiusculo. — Long. 6-7 millim.

Mas : niger paullo ænescens, mandibulis, antennis, pedibus et abdome fuscis. — Long. 7,5 millim.; ala ant. 6 millim. areola discoidali parva.

Habitat in terra locis campestribus aridis Galliæ meridionalis frequenter, eximie agilis.

Espèce plus petite que la précédente et d'un noir luisant un peu bronzé. La tête est de la grosseur de l'abdomen. L'élévation antérieure du corselet, constituée par le mésonotum et l'écusson, est plus haute que le métanotum. Le mâle est conformé comme le mâle du *F. viatica*, mais plus petit, noirâtre ; l'aile antérieure à peine de la longueur de 6 millimètres, légèrement brunâtre, à nervures foncées, épaisses.

FIG. 2. Ala antica maris.

SUBDIVISIO 4. — *Species mediæ vel minoris vel parvæ magnitudinis. Squama verticalis compressa. Operaria capite minore quam abdomen, thorace inter scutellum et metanotum impresso. Femina et mas alis area discoidali præditis* (fig. 3), *corpore longioribus vel saltem fere æquilongis.* — Spec. 14-30.

A. STIRPS *Formicæ rufæ. Color saltem thoracis in operaria in speciebus plerisque dominans rufus. Operariæ ocellis gaudent. Plurimæ acervicolæ.* — Spec. 13-22.

14. FORMICA RUFÀ Linn. *Faun. Suec.* 1721, ♂ ♀; Latr. *Fourm.* p. 143, t. 5, f. 28; Nyl. *Form. bor.* p. 902; Foerst. *Hym. Stud.* p. 13; Schenck *Nass. Am.* p. 23; Smith. *Brit. Form.* p. 100; Mayr. *Austr.* p. 56; *Formica polycrena* Foerst., *l. c.*, p. 15; Schenck, *l. c.*, p. 25; *F. truncicola* Foerst., *l. c.*, p. 21; *F. piniphila* Schenck, *l. c.*, p. 28; *F. obsoleta* Zett. *Ins. Lapp.* p. 449, ♀ ♀; *F. lugubris* Zett., *l. c.*, p. 449, ♂.

Operaria : rufo-ferruginea sat nuda, caput supra et abdomen fusco-