

**nigra**, macula saepius mesonoti æque ac antennis et pedibus fuscescentibus; **area frontalis** nitida; squama sursum rotundatim latior, integra vel in **majoribus** obtuse emarginatula. — Long. 6-8 millim.

**Femina** : ferrugineo-rufa nuda, fronte cum occipite, thorace superne (præter metanotum) et abdomen polito (præter maculam basalem et saepe ventrem anumque plus minus rufo-pallescens) fusco-nigris, antennis tibiis et tarsis fuscescentibus; area frontalis nitida. — Long. 10-11 millim.; ala ant. 10-11 millim. albescens-hyalina, a basi ultra medium leviter brunnescens, stigmate fusco.

**Mas** : niger opacus, sparse pubescens, pedibus saepe plus minus genitalibusque rufescentibus; area frontalis nitidiuscula; oculi parce microscopice pilosuli; squama subquadrata supra concaviuscula. — Long. 7-11 millim., ala ant. fere 10 millim.

In Galliae sylvis valde frequens, præsertim forma major (Nyl. *Addit. alter.* p. 29). Mares feminæque mensibus majo et junio obveniunt.

FIG. 3. Ala ant. feminæ.

**15. FORMICA CONGERENS** Nyl. *Form. bor.* p. 906, *Addit. alter.* p. 30; Foerst. *Hym. Stud.* p. 17; Schenck *Nass. Am.* p. 30; Mayr. *Austr.* p. 60.

**Operaria** : ferrugineo-rufa pilosa, caput supra, dorsum thoracis et abdomen fusco-nigra, area frontalis nitida; oculi microscopice parce pilosuli; squama supra integra vel leviter emarginata. — Long. 6-9 millim.

**Femina** : ferrugineo-rufa nuda leviter cinereo-micans, caput supra, dorsum thoracis (præter metanotum) et abdomen (præter maculam basalem et saepe ventrem anumque plus minus rufo-pallescens) fusco-nigra, antennis, tibiis et tarsis fuscescentibus; area frontalis nitida punctulata; oculi parce pilosuli. — Long. 10-11 millim.; ala ant. fere æquilonga.

**Mas** : niger levissime cinereo-micans, capite thoraceque crebre pilosus pubescentibus, genitalibus et pedibus ad partem rufescentibus; area frontalis nitida; oculi pilosuli; squama petiolaris integra vel superne concaviuscula. — Long. 9-11 millim.; ala ant. fere æquilonga.

Iisdem locis sylvaticis Galliæ ac præcedens, cui omni respectu affinis. Acervos similes construit. Odor acidus forte adhuc acerbior. Examinat mense junio.

Cette espèce se distingue assez facilement du *F. rufa* : l'ouvrière et le mâle, par la pilosité de la tête et du thorax; la femelle, par son abdomen moins luisant et d'un reflet cendré. L'abdomen de la femelle du *F. rufa* est d'un noir brillant.