

abdomen pilosum nitidissimum. — Long. 9-10 millim., ala ant. fere æquilonga leviter fuscescens.

Mas : niger, mandibulis apice, genitalibus, pedibus, sæpe adhuc scapis rufo-pallescensibus; mandibulae 1-2 dentatæ. — Long. fere 10 millim.

In Gallia rarius. Feminae maresque mensibus julio et augusto. Nidificat verisimiliter ut præcedens.

Il est plus noir, plus luisant que le précédent, et à petits poils roides hérissés, plus nombreux, surtout sur l'abdomen.

22. FORMICA NASUTA, n. sp.

Operaria : nigra gracilis nitidiuscula, nuda (pili modo pauci in clypeo antice), mandibulis, geniculis et tarsis pallidis; facies producta antice visa subrectangularis; clypeus obsolete carinatus; ocelli minutissimi; antennæ pedesque graciles; dorsum thoracis subæquale; squama oblonga integra. — Long. 3-3,5 millim.

Ad rupe calcareae prope Beaucaire Galliæ meridionalis.

Fourmi petite et élégante, facilement reconnaissable à la singulière conformation de la tête, présentant une face allongée et rectangulaire, aussi large près de la bouche qu'au sommet. Les palpes sont obscurs, et l'impression du corselet, derrière l'écusson, est peu marquée.

B. STIRPS Formicæ nigrae. Species minores vel parvæ. Color varius. Area frontalis obsoletea. Alæ maris feminæque corpore longiores. Mares sæpius parvi comparata magnitudine feminarum. — Sp. 23-30.

23. FORMICA FULIGINOSA Latr. *Fourm.* p. 140; Los. *Piem.* p. 315; Lepel. *Hym.* I, p. 200; Schill. *Schles.* p. 55; Nyl. *Form. bor.* p. 915; Foerst. *Hym. Stud.* I, p. 28; Schenck *Nass. Ameis.* p. 45; Smith. *Brit. Form.* p. 105; Mayr. *Austr.* p. 79.

Operaria : nigra nitidissima, mandibulis flagellisque rufescensibus, tarsis rufis; caput subcordatum (occipite late emarginato), thorace latius, magnitudine saltem abdominalis; squama parva subovata, marginibus lateribus parallelis, supero subtiliter setuloso. — Long. 4-5 millim.

Femina : nigra nitidissima sparse pilosula, mandibulis, antennis pedibusque rufescensibus, tarsis rufis; caput subcordatum; squama parva subovata. — Long. 6 millim.; ala ant. 8 millim. albescenti-hyalina a basi ad medium fuscescens, nervis et stigmate obscuris.

Mas : Niger nitidus, flagellis, articulationibus pedum et tarsis obscure pallescensibus; occiput concaviusculum; squama parva subquadrata, non-