

nihil rotundata. — Long. 4-5 millim.; ala ant. 5,5 millim., de cetero ut in feminæ, sed plerumque dilutior.

Habitat in truncis vetustis putrescentibus, in coloniis maximis. Spirat odorem aromaticum gravem, oleosi aliquid habentem (comparandum cum odore *Myrmicæ scutellaris*). Examinat in Gallia versus finem mensis junii:

La couleur d'un noir brillant, la grosse tête échancrée en arrière, et les tarses d'un roux pâle, constituent les principaux caractères distinctifs de cette espèce. C'est un des types les plus distincts parmi les espèces européennes, et qu'on ne pourrait confondre avec aucun autre.

24. FORMICA NIGRA Linn. *Fn. Suec.* 1723; *Latr. Fourm.* p. 136; *Los. Piem.* p. 317; *Lepel. Hymén.* I, p. 206; *Nyl. Form. bor.* p. 920; *Schenck Nass. Ameis.* p. 49; *Sm. Brit. Form.* p. 109; *Mayr Austr.* p. 83; *Formicæ fusca* Foerst. *Hym. Stud.* p. 33; *Lasius niger* Fabr. *Piez.* p. 415, ♂.

Operaria: fusco-nigricans vel obscure fusca nitida, sparse pilosa, mandibulis et scapis rufescentibus, flagellis et pedibus obscure pallescentibus, tarsis testaceo-pallidis; scapi et tibiæ pilis sparsis; squama subrectangularis parum emarginata vel integra. — Long. 3-4 millim.

Femina: fusco-nigricans nitida, cinereo-micans, mandibulis antennis (vel solum scapis), articulationibus pedum obscure pallentium tarsisque pallide rufescentibus; caput thorace angustius; scapi et tibiæ pilis sparsis; squama subrectangularis, supra medio fere angulatim late emarginata. — Long. 8-10 millim.; ala ant. 10-12 millim. albo-hyalina nervis et stigmate dilutis, nervo scapulari obscuriore.

Mas: niger vel fusco-niger nitidus, antennis, pedibus et tarsis obscure pallescentibus; linea frontalis distinete impressa; scapi et tibiæ pilis sparsis obsiti; squama parva supra parum concaviuscula. — Long. 4-5 millim.; ala ant. 4,5-5,5 millim., area discoidalis aut parva subquadrata vel nulla.

Est species maxime vulgaris Galliæ, in terra, sub lapidibus, in arena, in truncis putrescentibus nidulans. Mares feminæque mense augusto occur-
runt. Ab Italia in Lapponiam procedit; verisimiliter in Algeria non deserit.

Très ressemblant au suivant, dont il ne diffère guère que par les quelques poils fins et dressés, qui, outre la pubescence, s'observent sur les scapes et les jambes.