

25. FORMICA ALIENA Foerst. *Hym. Stud.* p. 36; Schenck *Nass. Am.* p. 51; Mayr *Austr.* p. 88.

*Operaria* : similis operariæ præcedentis, modo scapis tibiisque denu-datis. *Femina* et *mas* similiter ab iis ejusdem distinguuntur.

In Gallia vulgaris, in similibus habitans nidis in terra ac præcedens, a qua forte non bene sit separanda, nisi ut varietas. Etiam in Algeria obvenit (Mus. Paris.).

26. FORMICA EMARGINATA Latr. *Fourm.* p. 163; Los. *Piem.* p. 319; Lepel. *Hym.* I, p. 207; *Formica brunnea* Mayr. *Austr.* p. 86 (exclus. synon.).

*Operaria* : pallide vel cinerascenti-rufa, tenuiter pilosa, capite supra pedibus (exceptis eorum articulationibus et tarsis) et abdomine parum cinereo-micante infuscatis, abdomine tamen obscurius fusco; scapi et tibiæ pilis tenuibus; linea frontalis obsoleta; squama integra vel parum emarginata. — Long. 3-4 millim.

*Femina* : obscure rufo-pallescens cinereo-micans, supra (præsertim capite et abdomine) obscurior, segmento abdominalis primo plus minus sordide-pallescente, scapis et pedibus pallidioribus pilis tenuibus obsitis; caput thorace angustius; linea frontalis obsoleta; squama emarginata. — 8-9 millim.; ala ant. 10 millim. albescenti-hyalina.

*Mas* : fusco-niger, mandibulis, antennarum flagellis, articulationibus pedum et tarsis pallescentibus, capite abdomineque nitido obscurius nigricantibus, linea frontalis sat distincte impressa; frons nonnihil opaca; scapi et tibiæ pilis subtilibus muniti. — Long. fere 4 millim.; ala ant. 5 millim.

In Gallia haud rara, plerumque locis cultis obvia, in muris, terra et arboribus vetustis nidos faciens. Individua omnium sexuum odorem infestatæ exhalant moschi. Etiam in domos penetrat, cibos saccharinos avide comedens. Fine mensis julii vel augusto examinat.

Cette Fourmi, assez commune en France, se distingue du *Formica nigra*, avec lequel il offre les plus grandes affinités, par son corselet d'un rougeâtre pâle dans l'ouvrière, et par l'odeur de musc qui lui est propre, ainsi qu'à la femelle et au mâle; celui-ci a le front plus mat que le mâle du *F. nigra*.

27. FORMICA BRUNNEA Latr. *Fourm.* p. 168; Los. *Piem.* p. 319; *Formica timida* Foerst. *Hym. Stud.* p. 35; Schenck *Nass. Am.* p. 53; Mayr. *Austr.* p. 89.

*Operaria* : pallide vel cinerascenti-rufa, abdomine obscure infuscato;