

linea frontalis conspicua, elongata; scapi et tibiæ denudati. — Long. 2,5-3,5 millim.

*Femina*: fusco-nigricans cinereo-micans, antennis pedibusque testaceo-pallescentibus, flagellis et femoribus paullo obscurioribus; caput latitudine thoracis; scapi et tibiæ denudati; squama leviter emarginata. — Long. 8-9 millim.; ala ant. 9 millim. hyalina, ad vel ultra medium leviter infuscata, nervis et stigmate sordide luteis.

*Mas*: fusco-niger scapis et pedibus dilute fuscis, flagellis articulationibus pedum et tarsis pallidis; mandibulæ unidentatae; linea frontalis impressa; oculi nudi; squama angulatim emarginata; scapi et tibiæ denudati. — Long. 4-5 millim.; ala ant. 5 millim. ad medium leviter infuscata.

In Gallia passim, longe minus frequens quam præcedens.

Cette espèce diffère de la précédente à peu près comme le *Formica aliena* du *F. nigra*. L'ouvrière a la tête plus pâle que le *F. emarginata*; la tête de la femelle est plus large que celle de la femelle de la même espèce, et les ailes, en outre, comme dans le mâle, ont la moitié basilaire distinctement obscurcie d'une teinte brunâtre. — Elle a une distribution géographique très large; nous l'avons vue même de la Géorgie au pied du Caucase.

28. *FORMICA FLAVA* Fabr. *Ent. Syst.* 2, p. 375; Latr. *Fourm.* p. 166; Los. *Piem.* p. 331; Lepel. *Hymén.* I, p. 208; Nyl. *Form. bor.* p. 922; Foerst. *Hym. Stud.* I, p. 38; Schenck *Nass. Ameis.* p. 56; Smith *Brit. Form.* p. 108; Mayr *Austr.* p. 91.

*Operaria*: flava tota, leviter albido-micans, sparse pilosa (pilis pluribus in dorso thoracis); oculi parvi; squama sat parva supra fere truncata vel leviter emarginatula; scapi tibiæque denudati. — Long. 2-4 millim.

*Femina*: fusca nitida flavidio-micans, dorso thoracis magis nigricante, antennis pedibusque pallidis, ventre sordide pallescente; caput thorace angustius; squama obtuse angulatim late emarginata; scapi tibiæque denudati. — Long. 7-9 millim., ala ant. 9-10 millim. ad medium fere dilute infuscata.

*Mas*: fusco-niger nitidus, flagellis, articulationibus pedum et tarsis pallidis; mandibulæ 1-2 dentatae; linea frontalis sæpe nulla (vel impressione substituta longitudinali, accidente altera transversa); oculi prominuli subtiliter microscopice parce pilosuli; scapi tibiæque denudati. — Long. 3-4 millim.; ala ant. circa 4,5 millim. versus basin levissime vel vix infuscata.