

pedum tarsisque pallidis ; mandibulæ 9-denticulatæ ; clypeus margine infero sinu angusto exsectus , pilis 2 longis munitus. — Long. 2,5-3 millim.

*Femina* : nigra leviter cinereo-micans, thorace nitidiusculo, articulatio-nibus pedum et tarsis pallidis ; clypeus exsectus , ut in operaria. — Long. 5 millim. ; ala ant. æquilonga paullo fuscescens, nervis et stigmate dilute fuscis.

*Mas* : niger nitidiusculus , pedibus fuscis (femoribus obscurioribus) articulationibus anguste et tarsis pallidis , vel etiam tibiis pallescentibus ; clypeus margine infero medio emarginatus ; valvula analis ventralis bifidus lobos 2 distantes formans. — Long. 4 millim. ; ala ant. æquilonga leviter fuscescens, nervis et stigmate dilute fuscis , area discoidali haud raro non clausa.

Habitat in Gallia frequenter nidis maximis in terra variis locis, ut in arenosis et muscosis , agilitate et odore suavi nectareo insignis. Examinat mense junio. Feminæ alas facillime amittunt, nisi cautissime capiantur.

La description donnée par Latreille de son *F. erratica* (*l. c.*, p. 182), de Brives, ne convient pas bien à cette espèce ; je n'admets par conséquent, qu'avec réserve, que mon *Formica glabrella* soit la Fourmi désignée primitivement sous le nom d'*erratica*, qui devrait être d'un noir brun ou brun noirâtre, peu luisant, presque glabre, et avoir la tête grande, les pattes courtes, assez fortes, d'un brun jaunâtre pâle, plus foncé aux cuisses, excepté à leur extrémité. Ces caractères, et d'autres encore, ne s'appliquent guère au *F. erratica* Sm., Mayr.

33. FORMICA PYGMÆA Latr. *Fourm.* p. 183 ; Lepel. *Hymén.* I, p. 209; *Tapinoma pygmæa* Schenck *Nass.* *Ameis.* p. 68 ; Mayr *Austr.* p. 103 (*pygmæum*).

*Operaria* : fusca nitida nuda , pilis in abdomine parcis , antennis et pedibus dilutius fuscis vel fusco-pallescentibus, mandibulis, scapis, articulo primo flagellarum (hic fere longitudinem 3 sequentium adtingens), articulationibus pedum et tarsis pallidis ; clypeus infra integer ; mandibulæ dentibus validiusculis 6, inter se inæqualibus ; antennæ 11-articulatæ (præter radiculam scapi) ; dorsum thoracis subæquale. — Long. 1,5-2 millim. et interdum pauxillum ultra.

*Femina* (ex Mayr *l. c.*) : « brunnea nitida, mandibulæ , antennarum scapus ac funiculi articulus primus, articulationes pedum, tibiæ atque tarsi flava; antennæ 11 articulatæ ; abdomen thorace longius. — Long. 3-4 mil-lim. » Area discoidalis alæ anticæ clausa nulla.

*Mas* : brunneus, antennarum scapo cum articulo primo flagellarum et