

Insectum singulare, cæcum (1). Moribus cum Poneris convenire videtur. In Algeria primo a cel. Lucas observatum fuit sub lapidibus et interdum in nidis *Altæ capitatae*. Dein D. centurio Blanchard, in Misserghin, turbam vidit hujus speciei e trabe egressam (vide Ann. Soc. Entomol. 3, I, Bullet. p. XXXVIII, 1853). Individua sexualia ignota. — Ejusdem individua ex Abyssinia in Mus. Paris. mihi etiam benigne ostendit cel. Lucas. — *Dorylus juvenculus* Shuck., Luc. Explor. Algér. Ins. II, p. 299, quoque in Algeria a D. Lucas inventus, Ponerineis etiam referendus videtur, sed modo mas ejusdem a me examinatus.

FIG. 24. Antennæ. — FIG. 25. Palpus maxillaris. — FIG. 26. Palpus labialis.

V. MYRMICA Latr.,

Zett., Lepel., Los., Nyl.

Mandibulæ dilatatæ. Palpi varie in diversis stirpibus vel subdivisionibus articulati, maxillares articulis 6-1, labiales articulis 4-2 (2). Oculi mediocres, rarius parvi; ocelli in operaria nulli. Petiolus abdominis ovoidei binodis. Femina operariaque aculeatæ. Pupæ nudæ, cuticula tantum subtili membranacea, omnia corporis membra arcte includente, obductæ.

SUBDIVISIO 1. — *Species mediocres in hoc genere. Palpi maxillares 6-, labiales 4-articulati. Antennæ apice clavatæ. Area cubitalis prima alæ anticae nervo dividente ad medium extenso, itaque incomplete (dimidiatim) longitudinaliter divisa (fig. 6).* — Spec. 1-7.

1. MYRMICA RUBIDA Latr. Fourm. p. 267; Schilling Schles. p. 56; Mayr Austr. p. 128.

Operaria : pallide rufa, abdomen supra medio leviter fuscescente

(1) *Myrmica cæca* Latr. Fourm., p. 270, t. IX, fig. 56, offre encore un exemple d'une espèce de cette famille privée d'yeux.

(2) M. Mayr a le mérite d'avoir le premier exactement indiqué le nombre variable des articles des palpes dans les divers Myrmicinés; mais on a tort, à mon avis, de voir dans ces différences des raisons suffisantes pour établir des genres légitimes. Les subdivisions du genre *Formica* présentent certainement des différences plus considérables; mais la science n'aurait rien à gagner, il me semble, à une telle multiplication de noms génériques, fondés sur des distinctions peu naturelles et trop subtiles, et lorsque, au point de vue systématique, on peut les remplacer par des sections ou des subdivisions (Cf. Nyl. Addit. Form. bor., p. 1059).