

(æque ac interdum caput antice), tenuiter pilosa; caput et thorax (hic saltem lateribus) longitudinaliter striatula, metathorax inermis vel tuberculis 2 obtusis angularibus, postice striis transversis, saepe obsoletis insculptus; mandibulæ fere 15-denticulatae, dentibus 2 externis majoribus; nodi petiolares lœves. — Long. 7-8 millim.

*Femina*: pallide rufa, tenuiter pilosa, fascia abdominalis fusca (interdum quoque dorso thoracis posterius et capite antice fuscescentibus); capite thoraceque striatis; mandibulæ magnæ apice incurvæ; scapi basi curvata; metathorax tuberculo angulari obtuso utrinque, postice transversim striatus. — Long. circa 11 millim.; ala ant. 10 millim. leviter lutescens, stigmate fuscescente.

*Mas*: niger nitidiusculus tenuiter pilosus, flagellis apice et pedibus fuscis tarsis et ano pallescentibus, capite striato-opaco; mandibulæ magnæ apice decurvæ, intus piceæ; scapus brevis, longitudine fere articulorum 2 sequentium flagelli; metanotum pulvinatum subopacum transversim striatum; nodi elongati. — Long. 9-10 millim.; ala ant. fere æquilonga, tota paullo lutescens, stigmate dilute fuscescente.

In montanis Galliæ orientalis rarius, habitans in terra sub lapidibus. Adhuc in montibus Italiae borealis, Helvetiæ, Germaniæ, Hungariæ et in Caucaso haec species occurrit, sat alte interdum procedens; sed in Europa boreali omnino deest limitesque distributionis suæ geographicæ vix ultra Prussiam septentrionem versus extendit.

Ce *Myrmica* est plus grand que les espèces suivantes, et le seul de la première subdivision dont le métathorax n'a pas d'épines postérieurement. M. Færster a nommé le mâle, dans la collection de M. Fairmaire, *Myrm. rhynchophora*.

FIG. 7. Ala antica feminæ.

2. *MYRMICA LÆVINODIS* Nyl. *Form. bor.* p. 927; Færst. *Hym. Stud.* p. 64; Schenck *Nass. Ameis.* p. 75; Smith *Brit. Form.* p. 118; Mayr *Austr.* p. 130.

*Operaria*: pallide rufa tenuiter pilosa, capite supra dorsoque abdominalis in medio saltem leviter fuscescentibus; capite thoraceque longitudinaliter striatum rugulosis; scapus antennarum leviter arcuatim flexus, metanotum subtransversim rugulosum, spinis postice binis validiusculis; nodi sublæves. — Long. 4,5-5 millim.

*Femina*: sordidius pallide rufa, capite superne, pronoto, scutello et medio abdominalis saltem leviter fuscescentibus, capite thoraceque longitudinaliter striatum rugulosis; mandibulæ (ut in operaria) dentibus 6 vel 8;