

metanotum spinis brevibus validiusculis ; nodi sublaeves, obsolete rugulosi. — Long. 6-7 millim.; ala ant. fere æquilonga hyalina, stigmate pallido.

Mas : niger vel fusco-niger nitidus sparse tenuiter pilosus, mandibulis, flagellis, articulationibus pedum fuscorum, tarsis et apice abdominis paleo-lescentibus ; caput sat parvum subtiliter striato-rugulosum subopacum, mandibulae 7-dentatae ; metathorax dentibus binis angularibus ; tibiæ tenuiter pilosæ. — Long. 5,5 millim.; ala ant. æquilonga.

Habitat in Gallia frequentissime in arena, sub lapidibus, muscis, in truncisque putrescentibus. Mares feminæque mensibus augusto et septembri. Est, ut sequens, species latissime distributa ; in Sibiria quoque ambæ obveniunt.

Très voisin du suivant, dont il diffère par ses épines thoraciques moins fortes et des nœuds péticliaires plus lisses. Le mâle a la tête plus petite et les jambes plus velues; son scape égale en longueur les sept premiers articles du *flagellum*. L'aréole frontale est luisante dans l'ouvrière et la femelle.

3. MYRMICA RUGINODIS Nyl. *Form. bor.* p. 929 ; Først. *Hym. Stud.* p. 66 ; Schenck *Nass. Ameis.* p. 77 ; Smith *Brit. Form.* p. 416 ; Mayr *Austr.* p. 135 ; *Myrmica vagans* Fabr., Curt. *Myrm.* p. 213 (1).

Operaria : simillima præcedenti, sed sæpe pauxillum major, rufius fere rugosa, metanoto ante spinas validiusculas longas longitudinaliter rugoso et nodis longitrorsum confuse (sed non profunde) rugosis.—Long. 4,5-5,5 millim.

Femina : similis feminæ præcedentis, sed spinis metathoracis fere duplo longioribus, nodis rugosioribus. — Long. 6,5-7 millim.

Mas : simillimus mari præcedentis, sæpe paullo major, robustior, capite distinctius majore, tibiis nudioribus, stigmate alarum plerumque fuscio. — Long. 5,5-6 millim. (scapus antennarum 1,25 millim.).

(1) Dans la collection de Fabricius, à Kiel, il ne reste que des fragments du *M. vagans* (*Ent. syst.* 2, p. 358), et qui m'ont paru réellement appartenir à l'ouvrière de mon *M. ruginodis*; mais il est plus que douteux que Fabricius ait compris sous le premier nom une espèce bien définie. J'ai vu dans sa collection la femelle du *M. ruginodis* sous le nom de *M. rubra*, le mâle sous celui de *M. cæspitum*. C'est abuser, ce me semble, des principes de la nomenclature que de vouloir attribuer une signification déterminée à des dénominations tout à fait vagues et incertaines.