

SUBDIVISIO 2. — *Species saepius majores vel magnæ in hoc genere.*
Palpi maxillares 4- (in unica 5-) articulati , labiales 3-articulatæ.
Thorax operariæ saltem postice angustatus , medio constrictus. Ala
antica longa , nervo dividente (vide definitionem subdivisionis primæ)
usque ad aream discoidalem protenso , inde areæ cubitales ortæ clausæ
bincæ. Antennæ maris articulis 13 , præter radiculam scapi. — Atta
Auctor. et Aphænogaster Mayr.—Spec. 8-12.

8. MYRMICA SCALPTURATA, n. sp.

Operaria : nigra opaca, sparse pilosa, capite majusculo, capite thorace
 et nodis coriaceo-rugulosis et longitudinaliter striatis, temporibus vix striis
 ullis, æque ac sæpe pleuræ , abdome nitidiusculæ subtiliter coriaceo ,
 gula crebrius pilosa. — Long. 13-14 millim.

Ex Algeria et Egypto in collect. cel. doctoris Sichel. Magnitudo *Formicæ ligniperdæ* vel *herculeanæ*, quibuscum quoad habitum certam
 habet similitudinem. In collectione cel. L. Fairmaire adest ex Algeria
 femina exalata, quæ forsan sit hujus speciei : nigra nitidiuscula breviter
 flavidо-pilosa, mandibulis, flagellis et tarsis obscure rufis, capite, thorace
 et nodis striatis, striis nodi primi postice, ut metathoracis bidentati, distincte
 transversis , iis nodi posterioris subtilioribus magisque confusis ; abdo-
 men segmento primo coriaceo subopaco, ceteris nitidis.—Long. 17 millim.

9. MYRMICA CAPITATA Los. Piem. p. 325; *Formica* Latr. *Fourn.* p. 234; *Atta* Lep. *Hymén.* I, p. 173; *Luc. Alger.* II, p. 300; *Mayr* *Austr.* p. 190; *Form. barbara* Linn. *Syst. Nat.* II, p. 962; *Latr.* *l. c.* p. 262 (var. cap. rufo); *F. binodis* Fabr. *Piez.* p. 405; *F. juve-* *nialis* Fabr. *Piez.* p. 405.

Operaria : nigra vel piceo-nigra, nitida , flagellis , articulationibus
 pedum et tarsis rufescens , sæpe capite (in majoribus latit. 4 millim.
 adtingente) vel etiam thorace rubro-rufescens; caput et pleuræ sub-
 tiliter striata, metanotum inerme vel leviter bituberculatum. — Long.
 5-12 millim.

Femina : nigra vel piceo-nigra, nitida, sparse pilosa (mandibulis sæpe
 etiam capite obscure rufescente), flagellis, articulationibus pedum et tarsis
 rufis; pronotum lave vel leviter striatum; metanotum inerme aut utrinque
 tuberculo dentiformi.— Long. 13-15 millim. ; ala ant. 16 millim. hyalina
 nervis et stigmate fuscis.

Mas : niger nitidus, sparse flavidо-pilosus, mandibulis apice, articula-