

Plus petit que les précédents et à métanotum muni de deux épines distinctes; le premier article du pétiole est allongé.

FIG. 9. Ala antica feminæ.

12. MYRMICA TESTACEO-PILOSA Luc. *Explor. Alger.*, II, p. 300;
Aphænogaster senilis Mayr *Austr.* p. 194.

Operaria : nigra vel piceo-nigra opaca indique albido-setulosa, mandibulis, antennis, articulationibus pedum nitidorum tarsisque rufescens; caput thoraxque tenuiter granulata et striata, mandibulæ 6-dentatæ et scapi antennarum longitudinaliter striata; palpi maxillares articulis 5 (mediis 3 oblique acuminatis), labiales articulis 3; metanotum hispinosum; nodi rugulosi; segmentum primum abdominis subtiliter rugosulum, sericeo-opacum. — Long. 6-7,5 millim.

In Algeria lecta a DD. Lucas et Roussel. — Variat ibi rufescens et vix vel parum striata (*Aphænogaster sardous* Mayr l. c. p. 196). — In Sicilia vero capta est a cel. Zeller species valde affinis et similis huic varietati, sed paullulum minor et abdome toto nitido, lèvissimo. Dicatur *M. semi-polita*.

On reconnaît aisément le *M. testaceo-pilosa* à son scape finement strié, et à son premier segment abdominal d'un velouté mat (1).

FIG. 34. Palpi.

SUBDIVISIO 3. — *Species minores vel parvæ. Palpi maxillares 4-, labiales 3-articulati. Antennæ apice clavatæ, articulis 3 ultimis majoribus, in operaria et femina. Femina et mas (in specie primaria) ratione operariæ magni, alis magnis, nervis (costis) ut in subdivis. 4 et 5 generis Formicæ, area discoidali clausa.* — *Tetramorium* Mayr. — Spec. 13-15.

13. MYRMICA CÆSPITUM Latr. *Crust. Ins.* XIII, p. 259; Los. *Piem.* p. 327; Curt. *Myrm.* p. 215; Smith *Brit. Form.* p. 122; Mayr

(1) A cette subdivision (*Atta*) appartient encore le *MYRMICA PALLIDA* Nyl., Add. alter., p. 42, trouvé en Sicile par M. Zeller. Voici sa diagnose :

Operaria : pallide testacea tota, lèvis, nitida, sparse pilosa; mandibulæ dentibus acutiusculis 9; palpi maxill. 4- labiales 3-articulati; antennæ 12-articulatæ, articulis 4 ultimis paullo longioribus quam ceteris flagelli; pedes decumbenti-pilosi. — Long. 4 millim.; scapus 1,5, flagellum 2 millim. — In collectione L. Fairmaire adest sub nomine *M. rufotestacea* Først.

FIG. 33. Palpi.