

*Austr.* p. 154; *Formica cæspitum* Latr. *Fourm.* p. 251; *Myrm. fuscula* Nyl. *Form. bor.* p. 935, fig. 36; *Addit.* p. 1053; Færst. *Hym. Stud.* p. 56; Schenck *Nass. Ameis.* p. 86; *Myrm. impura* Færst. *l. c.* p. 48; *M. modesta* Færst. *l. c.* p. 49.

*Operaria*: fusco nigra, mandibulis, antennis, articulationibus pedum et tarsis rufescens (vel tota dilutior sordide rufescens capite supra et medio abdominis fuscescentibus); caput (supra visum subrectangulare) et thorax longitudinaliter striatula; metanotum spinis parvis; nodi petiolares sublaeves, posterior (supra visus) transversim ovalis.—Long. 2-3,5 millim.

*Femina*: fusco-nigra, nitida, capite sat opaco et pleuris striatis, antennis (vel saltem flagellis), articulationibus pedum dilute fuscorum et tarsis (haud raro simul tibiis) pallide rufescens; antennæ 12-articulatæ; metanotum spinis parvis.—Long. 7-8 millim.; ala ant. 8,5 millim. albo hyalina, nervis et stigmate dilutis.

*Mas*: niger nitidiusculus, capite parvo sat opaco, antennis et pedibus plus minus dilute pallescentibus; mandibulæ subsex-denticulatæ; antennæ 10-articulatæ; articulo secundo flagelli elongato, longitudine saltem 4 sequentium (4-7 antennæ).—Long. 6-7 millim.; ala ant. circa 5 millim. albo-hyalina.

In Gallia vulgatissima. Habitat in terra locis arenosis vel in pascuis, æque ac *Form. nigra*. Feminæ maresque mense julio volant.

FIG. 35. Antenna maris.

Aisément reconnaissable à sa tête presque rectangulaire, un peu dilatée, finement striée, et à son nœud pétioinaire postérieur oblong et transversal. Le scape du mâle est grêle, cylindrique, droit, et presque de la longueur du deuxième article du funicule. Les *M. impura* et *modesta* Færst. ne constituent que des modifications pâles de cette espèce (1). J'ai observé dans le midi de la France, à Beaucaire, une de ces variétés pâles, dont l'ouvrière, longue à peine de 2 millimètres, a le front presque lisse ou à stries peu visibles. M. Mayr décrit, *l. c.*, p. 457, sous le nom de *Tetramorium atratum*, une espèce très voisine et difficile à distinguer des formes plus noirâtres du *M. cæspitum*. L'ouvrière est

(1) Le *Tetramorium Kollaris* Mayr, *l. c.*, p. 453, qui se trouve dans les serres chaudes de Vienne, en Autriche, ne me paraît pas différent du *Myrm. bicarinata* Nyl. *Addit.*, p. 464. Il est d'un fauve ferrugineux avec l'abdomen noirâtre, la tête striée sur le front, à deux côtes latérales plus saillantes, chacune d'elles ayant à son côté extérieur un sillon se prolongeant jusqu'au sommet, et servant à loger le scape de l'antenne. Ce sillon est cependant moins excavé que dans le *Myrm. sublaevis* Nyl. *Addit. alter.*, p. 33, parasite du *Myrm. acervorum*.