

~~ne~~, n'a aucune bande foncée ; on voit seulement quelquefois les bords latéraux du premier segment légèrement obscurcis d'une manière vague. Néanmoins il se peut que le *M. simpliciuscula* ne soit qu'une variété à bande abdominale effacée du *M. interrupta* Schenck Nass. Am., p. 106 et 140 (Mayr Austr., p. 174). Cela paraît douteux cependant, car celui-ci est décrit comme ayant un *fuscia interrupta abdominis supra nigro-fusca* (1), et les nombreux individus que j'ai vus du *M. simpliciuscula* ne m'ont rien présenté de semblable.

Fig. 40. Mandibula, palpi et antenna operariæ.

B. *tennæ clava rufa vel flagello concolore*. — Spec. 20-21.

20. **MYRMICA CINGULATA** Schenck Nass. Ameis. p. 104; *M. unifasciata* (Latr., verisimiliter primitiva) Nyl. Addit. alter. p. 44; *M. Nylanderi* Færst. Hym. Stud. p. 53, ♂; *Leptothorax Nylanderi* Mayr Austr. p. 175; *Myrm. parvula* Schenck Nass. Ameis. p. 103 et 140; *Leptothorax parvulus* Mayr Austr. p. 176.

Operaria : similis operariæ *Myrmicæ unifasciatæ*, solum clava antennarum pallida et interdum fascia abdominalis latiore, ut abdomen contractum supra fere totum, excepta basi, fusco-nigrum appareat. — Long. circa 3 millim.

Femina : similis quoque feminæ *M. unifasciatæ* eodemque modo diversa. — Long. 4-4,5 millim.

Mas (ex Mayr l. c.) : « fusco-niger, thorax obscure fuscus, mandibulæ, antennæ 13-articulatæ pedesque lividi aut rufescentes ; thorax petio-
busque sublæves nitidi. — Long. 3 millim. »

Prope Parisios saltem passim obvenit. Nomen a cel. Schenck datum, utpote operariam h. e. formam potissime typicam et maxime distinctam individuorum speciei designans, præferendum existimare liceat nomini a Domino Færster mari soli attributum h. e. sexui formicarum sæpius ægerime definito separatoque ab individuis speciei cuiuslibet affinis. Dein ex mea sententia, nomina personalia evitanda ; meliora sunt quæ notam quandam speciei exprimunt vel in memoriam revocant.

Le *M. corticalis* Schenck Nass. Am. p. 100 (*Leptothorax* Mayr Austr.,

(1) Voici, d'après M. Mayr, l. c., les diagnoses de la femelle et du mâle du *M. INTERRUPTA* : *Femina* fusca, mandibula, antennæ 12-articulatæ, excepta clava, pedesque flavi, abdomen flavum supra fasciis latis nigro fuscis, metanotum spinis mediocribus ; long. 3,7 — 4 millim. — *Mas* fusco-niger, antennæ 13 articulatæ pedesque fusci, mandibulæ, articulationes pedum tarsique pallentes ; long. 2-3 millim.