

p. 168), est une espèce voisine, plus foncée à la tête, avec l'abdomen en dessus, d'un brun noirâtre, les pattes brunes, et les dents du métanotum horizontales. — Le *Leptothorax affinis* Mayr, *l. c.*, p. 470, également voisin, ne me paraît pas bien distinct du *M. simillima* Nyl. (1), *Sm. Br. Mus. Hym.*, p. 448, caractérisé surtout par son corselet plus rugueux et strié.

21. MYRMICA RECEDENS, n. sp.

Operaria : pallida capite et fasciis 2 abdominis dilute sordidis (prima dilatata), corpus lave nitidum, superne pilis setiformibus adspersum albidis; mandibulæ 5-dentatæ; clypeus carina subtilissima inferius munitus; dorsum thoracis loco scutelli impressum, meso- et metapleuræ rugulosæ opacæ, metanotum utrinque dente oblique sursum verso; tibiæ absque pilis ullis erectis. — Long. 3 millim.

Habitat in Gallia meridionali, ubi eam prope Beaucaire inveni.

Il ne ressemble à aucune espèce de cette subdivision, et l'on serait plutôt tenté de le rapprocher du *M. pallidula*, si la conformation des palpes ne l'en éloignait tout à fait. Le *M. recedens* ressemble au *M. pallidula* par son corps lisse, mais il est moins poilu, les jambes et les scapes sont dépourvus de poils hérisssés, le dos du corselet est plus égal, le métanotum bidenté. La tête et le corselet lisses la distinguent des autres espèces de cette subdivision.

Le *M. (2) lœvigata* Smith, *Brit. Form.*, p. 430, m'est inconnu. La diagnose « rufo-testacea, lœvis, tota nitidissima nuda, mandibulis, antennis, pedum articulationibus tarsisque pallescentibus, nodo primo angusto, metathoracis spinis angustissimis, » semble indiquer des différences évidentes de notre *M. recedens*.

Fic. 41. Palpi, antenna et mandibula operariae *Myrmicæ recedentis*.

SUBDIVISIO 5. — *Species parva, parasita nidorum Formicæ rufæ et congerentis. Corpus nitidum, lœve. Palpi maxillares articulis 4, labiales articulis 3. Mandibulæ dentatæ. Operaria feminaque spinula munitæ sub nodo petioli posteriore, antennis apicè clava 3-articulata, ut in subdivisione præcedente.* — Formicoxenus *Mayr* (nomen male compositum); Stenamma *Westw.* — Spec. 22.

22. MYRMICA NITIDULA Nyl. *Form. bor.* p. 1058 et *Addit. alter.*

(1) *MYRM. SIMILLIMA* : *Operaria* valde similis *Myrmicæ tuberum* eademque magnitudine et eodem colore exceptis antennis totis pallidis et abdominē obscuriore, toto infuscato; sculptura paullo rudior, in capite regulariter striata (absque ullo spatio longitudinali lœvigato); dorsum thoracis æquale nulla suturæ transversa impressum; spinulæ metanoti parvæ oblique sursum versæ; tibiæ denudatæ. — In Dorsetshire Angliæ (Coll. amici Fr. Smith).