

p. 34; Færst. *Hym. Stud.* p. 55; *Formicoxenus nitidulus* Mayr *Austr.* p. 146; *M. laeviuscula* Færst. *Hym. Stud.* p. 54 et 73; *M. debilis* Færst. *Hym. Stud.* p. 52, mas.

*Operaria*: pallide rufa lœvis, nitida, abdomine saltem supra fusco (excepta basi et apice pallescentibus); antennæ articulis 12; metanotum a scutello suturo leviter impressa discretum dentibus postice 2 validis horizontalibus; nodus petioli anterior infra processu cariniformi, posterior infra antice spinula valida antrorsum versa. — Long. 2,5-3 millim.

*Femina*: pallide vel sordide rufa lœvis, nitida, capitis thoracis et abdominis partibus superis fuscescentibus, hoc obscuriore, capite interdum toto pallido, ventre plus minus infuscato; mandibulæ dentibus 5; metanotum processu dentiformi utrinque.—Long. 3 3,5 millim.; ala ant. 2,7-3 millim. hyalina stigmate fuscescente, area discoidali parva (raro deficiente), radiali aperta.

*Mas*: fusco-niger, mandibulæ 3-dentatis, antennis 13-articulatis pedibusque pallescentibus, femoribus obscurioribus; metanotum dentibus 2 brevibus sursum versis.—Long. 3,5 millim.; alæ levissime vel obsolete fuscescentes, stigmate et nervis dilutis.

Habitat sparsa in acervis *Formicæ rufæ* et *congerentis*, e quibus numquam egressæ visæ sunt saltem operariæ. E Gallia adest in collectione amici Léon Fairmaire.

Son singulier habitat dans les nids des Fourmis acervicoles, et son corps entièrement lisse, luisant et dénudé, font facilement distinguer cette belle petite espèce de toutes ses congénères. Sa forme est celle des espèces de la subdivision précédente. L'ouvrière est le plus souvent dépourvue de stellmates. Le mâle constitue le *Stenamma Westwoodii* Steph., Westw. *Introd. class. Ins.* I, p. 83 et 2, p. 226, fig. 86, 11 (*male*); Curt. *Myrmic.* p. 217, fig. 24 (*ala bene*).

FIG. 41. Ala antica feminæ. — FIG. 42. Antenna operariæ.

SUBDIVISIO 6 (forte non separanda a subdivis. 4). — *Species minores vel fere mediocres parasitæ nidorum Myrmicarum subdivisionis quartæ: Palpi maxillares articulis 5, labiales articulis 3. Mandibulæ margine apicali truncatæ, concaviusculæ, inermes. Scapi antennarum 11-articulatarum deplanati.* — Spec. 23.

23. MYRMICA SUBLÆVIS Nyl. *Additam. alter.* p. 33.

*Operaria*: pallide rufa sat crebre setulosa, abdomine supra (excepta basi) fuscum vel fuscescens; caput majusculum subrectangulare et thorax