

*ticulatæ, scapus brevis vix longitudine articuli ultimi flagellaris; metanotum dente parvo utrinque. — Long. 3-3,5 millim.; ala ant. æquilonga.*

Habitat in Gallia tota (Monspelii æque ac Parisiis) passim, exceptis forsan regionibus alpinis, unde hanc non vidi. In Belgia (Wesmael) et Helvetia (Saussure) quoque adest. Mas et femina mensibus augusto et septembri adparent.

L'ouvrière ressemble un peu au *M. cæspitum* ♀, mais elle est plus foncée, avec la sculpture plus profonde, la tête et le corselet plus courts, le chaperon bidenté, les épines du métanotum horizontales. Le mâle et la femelle offrent des différences encore plus considérables. Le chaperon de l'ouvrière et de la femelle a souvent une carinule médiane, simulant une troisième dent intermédiaire plus petite; leurs mandibules ont neuf dents, dont les deux externes seulement sont distinctes; les mandibules du mâle en présentent trois assez fortes.

FIG. 42. Ala ant. feminæ. — FIG. 47. Palpi operariæ; b. clypeus; c. mandibula. — FIG. 48. Antenna ejusdem.

SUBDIVISIO 8. — *Species parvæ, læves, libenter in domos intrantes, devastationibus variis molestæ. Palpi maxillares et labiales bi-articulati. Clava antennarum 3-articulata. Corpus operariæ gracile-scens. Ala ant. (in specie primaria) area discoidali et cubitalibus binis clausis, radiali aperta. — Oecophthora Heer. — Spec. 25-26.*

25. MYRMICA PALLIDULA Nyl. Addit. alter. Form. bor., p. 42; OECOPHTHORA pallidula Mayr Austr. p. 183; OEC. subdentata Mayr neue Ameis.

*Operaria* : pallide rufa vel paullo fuscescens lævis nitida, tota pilosa vel setulis longis tenuibus adspersa; antennæ 12-articulatæ, scapo elongato; dorsum thoracis loco scutelli impressum metanotum tuberculo dentiformi utrinque obsoleto vel nullo; tibiæ æque ac scapus pilosi. — Long. 2-2,5 millim.

*Miles* : similis operariæ, major, capite maximo latit. 1 millim. interdum adtingente, mandibulis obscurioribus, abdomine interdum fuscescente, capite antice striatulo, occipite emarginato vertice linea impressa, metanoto bidentato. — Long. 4-4,5 millim. (Pili corporis sursum attenuati, non setiformes).

*Femina* : rufa, capitis, thoracis et abdominis partibus superis plus minus infuscatis; caput leviter striatum; metanotum tuberculo dentiformi utrinque; tibiæ pilosulæ. — Long. 7-7,5 millim.; ala ant. fere æquilonga albo-hyalina, nervis dilute flavidis dispositione ut in *M. subterranea*.