

*Mas* (ex Mayr l. c. p. 184) : « fusco-niger, nifidus, mandibulæ, antennæ 13-articulatæ, margines segmentorum thoracis, genitalia pedesque testacea. — Long. 4,5-5 millim. »

Locis campestribus aridis in Gallia meridionali (Beaucaire, Monspelii), in terra sub lapidibus. Unica est hujus familiæ species europæa, quæ formam quartam individuorum offert. Milites, ut haec individua dicuntur, non omnibus in nidis observavi; titulo suo parum sunt digni, nam ut animadvertisit jam cel. Mayr, domicilium commune vix defendere videntur. In Algeria lecta est a D. Roussel, qui ibi in domo etiam feminam mense junio cepit.

Le corps, les scapes et les pattes sont beaucoup plus poilus dans cette espèce que dans le *M. recedens*, qui lui ressemble au premier abord. Les mandibules ont dix à douze dents, et chez le mâle quatre (d'après M. Mayr). Les mandibules du *M. recedens* n'ont que cinq dents.

FIG. 49. Palpus maxillaris operariæ. — FIG. 50. P. labialis ejusdem. — FIG. 51. Antenna ejusdem. — FIG. 52. Mandibula ejusdem.

26. *MYRMICA DOMESTICA* Shuck. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 1838 p. 628, *Trans. Ent. Soc.* 2, p. 65; Daniell *Proceed. Linn. Soc.*, 2, p. 172; Smith *List. of Br. Mus.* p. 119 et *Brit. Form.* p. 130.

*Operaria*: pallida subnuda lœvis opaca, abdomen nitidum parte posteriore fuscescens; mandibulæ 4-dentatae; scapus fere longitudine flagelli 11-articulati, articulis 3 ultimis majoribus; metanotum inerme; scapus et tibiæ nudi. — Long. 2 millim.

*Femina*: ex clar. Smith, long. circa 4,5 millim. pallida, thorace maculis fuscous, fascia fusca in segmento primo abdominis lata antemarginem, et sequentibus fusco-marginatis.

*Mas*: fusco-niger subopacus, abdomen nitido, antennis pedibusque pallidis; scapus brevis vix longitudine articulorum 2 sequentium flagelli. — Long. fere 3 millim., ala ant. hyalina prope æquiora, nervis dilutissimis, area discoidali nulla clausa. (Collect. cel. doctoris Sichel.)

Habitat Parisiis in domibus rarius. Species primitus exotica, immigrata.

Très petite espèce, d'un fanve pâle, presque mat, sans rugosités, à scape allongé et dénudé. Les mandibules et les palpes sont à peu près comme dans le *M. fugax*. Elle est redoutable pour les dégâts considérables qu'elle peut causer dans les maisons où elle s'est établie en colonies nombreuses.

FIG. 53. a. Palpus maxillaris operariæ; b. P. labialis. — FIG. 54. Antenna ejusdem.