

loco scutelli leviter impressus, metanotum dentibus 2 obsoletis; nodus posterior transversus; pedes subnudi. — Long. 3-3,5 millim.

*Femina*: fusca vel fusco-rufescens spare pilosa, corpore infra cum pedibus et antennis pallide rufis; caput thoraxque striata, clypeus laevis, occiput profunde emarginatum; metathorax bidentatus; pedes subnudi. — Long. 3,5- fere 4 millim.; ala ant. albo-hyalina fere 4,5 millim. longa, nervis et stigmate incoloribus, area radiali aperta, discoidali majuscula.

*Mas*: fusco-niger sparse pilosus, ore, antennis pedibusque pallidis, fasciis ante margines segmentorum abdominis pallescentibus; articulus secundus flagelli longitudine saltem scapi; occiput emarginatum utrinque postice dentem formans; mesonotum striatum, metathorax utrinque dente obtuso, obsoleto. — Long. 4 millim.; ala ant. 4,5 millim.

In Gallia hæc species capta est a D. Léon Fairmaire ad la Teste (feminæ maresque mense julio) consociata cum operariis, obiter visis subsimilibus, *Myrmicæ cæspitum*, quas servarum loco sibi adjungere videtur. Differt igitur genus *Strongylognathus* a *Myrmica*, æque ac *Polyergus* a *Formica*, non solum vitæ genere, operarias ita auxiliarias alienas assimendō, sed etiam forma analoga mandibularum. Quamvis alter horum chāractērum, seu subjectio servarum instar operiarum speciei alius, non sufficiat ad genera, de quibus agitur, separanda (ut exemplum sistit *Formica sanguinea* Lat.), tamen ambis his differentiis simul obviis distinctio generica legitima certe abunde probatur. Atque animadvertisendum, nullo absque dubio differentias systematicas *Strongylognathi* longe majoris esse ponderis dignationisque quam notas subdivisionum generis *Myrmicæ* nostrarum, quibus perperam, ut existimo, generum sensum adtribuit cel. Mayr. Licet *Strongylognathus testaceus* duobus tantum locis (Nassau, la Teste) adhuc observatus sit, verisimiliter, quando attente inquiratur, frequentius latiusque distributus invenietur.

On ne saurait confondre cette intéressante espèce, découverte par M. le professeur Schenck, à Nassau, et qui est la seule du genre, avec aucune autre Fourmi. Elle offre une certaine ressemblance de port avec le *M. cæspitum*; mais ses mandibules sont étroites et courbées, sa tête est échancrée postérieurement, son métathorax presque inerme, etc. Par une singulière analogie, les antennes du mâle ressemblent aussi extrêmement à celles du mâle de la *M. cæspitum*; ni l'ouvrière, ni la femelle, n'offrent non plus aucune différence de cette dernière espèce sous ce rapport. Il est probable (comme l'ont dit déjà MM. Schenck et Mayr) que le *Strongylognathus* s'empare des nymphes de l'ouvrière du *Myrm. cæspitum* de la même manière que le *Polyergus* de celles du *Form. cunicularia* ou *fusca*.

FIG. 15. Ala antica feminæ. — FIG. 64. Antenna mari s.