

Capra per Porto Bardia (Cirenaica) (1). Però la *G. minima* ha l'ovopositore nettamente più lungo che la nuova specie ed inoltre la sua lamina sopranale ha una piccola incisione nel mezzo del margine posteriore e sul dorso della stessa lamina si notano due grossi rilievi che mancano assolutamente in *G. pygmaea*.

*Gryllomorphà* sp. (*prope minima* Wern.).

Una femmina di El Azizia. È specie molto vicina alla *G. minima* Wern. ed ancor più alla specie precedente. Dalla prima si differenzia per la medesima particolarità della *G. pygmaea* e da questa soltanto per la statura maggiore, per l'ovopositore e le tibie posteriori più lunghe. È molto probabile che essa, a parte la statura, sia identica a quest'ultima specie, ma solo con l'esame di un più abbondante materiale sarà possibile affermarlo.

### **Embiotteri** (Menozzi deter.).

*Monotylota Ramburi* Rimsky Korsakow

Una femmina raccolta ad El Azizia sotto ad un sasso. Specie non compresa nel Prodrómo dello Zavattari (l. c.), ma già citato per la Tripolitania dal Silvestri nel suo Compendio di Entomologia applicata, vol. I, pag. 131, Portici 1934.

### **Dermatteri** (Menozzi deter.).

*Euborellia annulipes* var. *tripolitana* Wern.

Un maschio raccolto a Sabratha sotto ad un sasso, che attribuisco provvisoriamente alla sopracitata varietà, corrispondendo nella forma dei metaparameri agli esemplari di Homs e di Giarabub citati dal Capra (l. c. pag. 153, fig. 19 b).

*Labidura riparia* Pall.

Una serie di esemplari dei due sessi raccolti a Tagiura. Essi sono di colore molto chiaro, con le due fascie scure longitudinali delle elitre assai marcate.

*Forficula auricularia* L.

Una diecina di esemplari fra maschi e femmine raccolti a Gar Garabulli sotto ad un tronco di un Eucalipto.

---

(1) CAPRA F., *Ortotteri e Dermatteri*, in *Risultati Zoologici della Missione della R. Soc. Geog. Ital. per l'esplorazione dell'Oasi di Giarabub* (1926-1927). « Ann. Mus. Civ. Stor. Natur. Genova », vol. LIII, pag. 137, 138, 1929.