

Cerimbicidae. .

Trichoferus griseus v. *fasciculatus* Fald.

Parecchi esemplari che ottenni il 16. VIII. 1937 da rametti di fico raccolti nei dintorni di Tripoli. Era citato della Cirenaica.

Chrysomelidae.

Timarcha laevigata L.

Due esemplari di El Azizia ed uno di Garian.

Chrysomela bicolor F.

Un esemplare di Garian su un cespuglio di *Thymus*.

Lariidae.

Laria pisorum L.

Una diecina di individui di Tagiura. Non risulta sia stata ancora citata per la Libia.

Pseudopachymerus lallemani Mars.

Tagiura; comunissimo entro ai semi di *Acacia cyanophila*. Anche questo Lariide non mi pare sia stato ancora segnalato per la Libia.

Curculionidae.

Brachycerus plicatus Gyllh.

Numerosi esemplari dei due sessi raccolti entro ai bulbi di *Urginea maritima* Bak. (= *Scilla maritima* L.) nell'oasi di Zanzur.

Questo curculionide è già stato osservato dal Dott. G. M. Martelli (1) come ospite del bulbo della Scilla. Egli però notò solo qualche raro esemplare nella parte apicale del bulbo, fra le scaglie secche. Gli esemplari raccolti da me erano invece tutti (una trentina), alloggiati ciascuno in una ampia nicchia, per lo più scavata nella parte interrata del bulbo, probabilmente dalla larva di essi. Al momento della raccolta, 6 novembre 1936, non trovai però nessuna larva.

Porocleonus candidus Oliv.

Un esemplare di El Azizia rinvenuto su una pianta di Tamerici.

Larinus vittatus F.

Un esemplare di Tagiura. Se la determinazione è giusta è specie nuova per la Tripolitania. In Cirenaica si trova invece il *L. vittatus* ssp. *rugicollis* Boch.

(1) G. M. MARTELLI, *La possibilità di coltura della Scilla in Tripolitania e del suo sfruttamento industriale*. « Agricol. Libica », anno VI, n. 5, 1937.