

Scolytidae.

Hypoborus ficus Erch.

Numerosi individui da rametti di fico dei dintorni di Tripoli. Nuovo per la Tripolitania.

Imenotteri.

Diapriidae (Menozzi deter.).

Trichopria sp.

Una femmina, trovata sotto la corteccia di un olivo, che non è possibile identificare specificamente con sicurezza su un solo esemplare.

Nessuna specie di Diapriide era stato sinora indicato per la Libia.

Bethylidae (Menozzi deter.).

Dermasoths n. g.

F e m m i n a . — Testa trasversale, suborizzontale, leggermente depressa. Occhi grandi e glabri, preceduti da un piccolo gruppo di setole sorgenti da una comune fossetta. Ocelli indistinti. Lobo frontale sporgente in avanti e ricoprente la base dell'inserzione delle antenne. Queste sono composte di 11 articoli. Le mandibole sono sublineari, bisolcate al margine esterno, terminate a punta e provviste al margine masticatorio di un piccolo dente collocato poco prima dell'apice dello stesso margine. Palpi mascellari corti di 4 articoli, i labiali di 3.

Torace con pronoto relativamente grande, lungo poco meno del restostante complesso toracico. Ali atrofizzate. Zampe con femori e tibie fortemente dilatati; i tarsi delle zampe anteriori, nonché le tibie del secondo e terzo paio sono fornite di numerose spine di varia grossezza e lunghezza; le unghie hanno un vistoso dente alla base; anche delle zampe anteriori e posteriori rispettivamente riavvicinate fra di loro, quelle intermedie sono sensibilmente scostate e fra di esse, all'estremità inferiore della regione mesosternale, sporgono due piccoli processi laminiformi la cui estremità è arrotondata.

Addome col gastro leggermente convesso al dorso, subfusiforme e costituito apparentemente di 7 uriti.

Genotipo: *Dermasoths endecamerus* n. sp.

Dermasoths endecamerus n. sp. (fig. V).

F e m m i n a . — Di un colore generale castagno ferrugineo; il capo è nero pece; il torace (eccetto una stretta fascia trasversale alla base del pronoto del medesimo colore generale), un'area mediale anteriore nel