

un unico esemplare del Libano. D'altra parte, sulla scorta dell'esame di 600 maschi di *Dorylus*, raccolti in diverse località della Palestina, notavo, nel succitato mio lavoro, che la colorazione del capo in questi esemplari, che avrebbero dovuto appartenere alla varietà in questione, è variabilissima, concludendo quindi, anche per questa ragione, sulla insussistenza di essa.

Successivamente però il Santschi (1) ha stabilito che il maschio della var. *ruficeps* differisce da quello della var. *punicus* per un carattere molto più valido, cioè la conformazione degli stipeti delle rispettive armature genitali. Tale differenza l'ho rilevata anch'io esaminando il numeroso materiale della Tripolitania e dell'Algeria della mia raccolta e le due anzidette varietà devono quindi giustamente ritenersi valide.

È molto probabile che tutti gli esemplari di Tripoli e Cirenaica, sinora determinati come appartenenti alla forma tipica del *D. fulvus* siano invece da riferirsi alla var. *punicus* Sants.

Dorylus (Alaopone) atriceps ssp. *aethiopicus* Em.

Parecchie operaie tutte al disotto dei 4 millimetri di lunghezza, raccolte ad El Azizia sotto ad un tronco di palma.

Ponerinae.

Ponera punctatissima Rog.

Una femmina dealata e due operaie che rinvenni a Tagiura sotto ad una pietra interrata. È la prima specie di *Ponerinae* che viene segnalata per la Libia.

Myrmicinae.

Messor arenarius F.

Numerosi individui di Tagiura ed El Azizia.

Messor barbarus L.

Operaie e qualche femmina di El Azizia e Tagiura.

Messor aegyptiacus ssp. *fossulatus* Sants.

Alcuni individui di El Azizia. Noto per la Cirenaica, ma non era ancora stato trovato in Tripolitania.

Messor semirufus ssp. *grandinidus* Sants.

Maschi, femmine e operaie di Garian, El Azizia e Sabratha.

(1) F. SANTSCHI. *Quelques nouvelles fourmis d'Egypte*. « Bull. Soc. Roy. d'Entom. d'Egypte », pag. 29-30, 1936.