

*Monomorium salomonis* ssp. *areniphilum* Sants.

Alcune operaie trovate vaganti nei dintorni di El Azizia.

*Leptothorax bugnioni* ssp. *pupseli* var. *martellii* n. var.

Operaia. — Capo, postpeziolo e gastro di colore nero piceo, torace e peziolo rosso ferrugineo, antenne e zampe brunastri. Scultura quasi simile a quello della ssp. *pupseli*, però le rughe del capo sono ancora più sottili, per cui la punteggiatura che vi è fra di esse predomina distintamente. Per contro nel torace e nel pedicolo le rughe sono più fitte e più alte di modo che i punti sono meno visibili. Le strie del gastro sono molto sottili ed affatto prive di punti fra di esse. Pilosità come nel tipo della sottospecie.

Spine dell'epinoto gracili e decisamente dirette in alto. Peziolo con peduncolo sottile e che appare un poco più allungato di quello della ssp. *pupseli*. Postpeziolo con nodo più largo di quello del peziolo. Femori e tibie opache per effetto di una distinta zegrinatura.

Lungh. mm. 3,7-4,5.

Femmina. — Colorazione come nell'operaia. Lo scudo del mesonoto è fornito di tre macchie brune, più o meno distinte, delle quali una posta a ciascuno dei lati nella metà della porzione posteriore dello scudo, mentre la terza, più grande, è situata nel mezzo del margine anteriore. Anche lo scudetto e la stretta superficie dorsale del metanoto sono per lo più rimbruniti. Rughe del capo, torace e pedicolo di fattura simile a quella dell'operaia, solo nel capo, soprattutto ai lati, esiste la punteggiatura che non è però così distinta come quella dell'operaia; nel torace e nel pedicolo non vi è addirittura alcuna traccia di punti. Gastro liscio o quasi, solo con un forte ingrandimento è possibile scorgere tracce di strie, in ogni caso è sempre lucido.

Il capo è di poco meno largo del torace. Questi ha l'epinoto fornito di spine dirette in alto come nell'operaia, ed un poco più brevi dello spazio esistente fra l'interno delle loro basi. Il peduncolo del peziolo inferiormente ha l'appendice spinosa più sviluppata di quella dell'operaia; il nodo è un poco meno alto di quello del postpeziolo.

Lunghezza mm. 6,5-7.

Ho raccolto a Tagiura, sotto ad un sasso, un formicaio completo di questo *Leptothorax*, composto di una cinquantina di operaie e tre femmine. Questa nuova varietà è dedicata al collega Dr. G. M. Martelli del Centro Sperimentale Agrario e Zootecnico della Libia che ci fu cortese guida nelle escursioni fatte nei dintorni di Tripoli.

*Leptothorax exilis* var. *specularis* Em.

Alcune operaie di Tagiura rinvenute sotto ad una pietra. Esse mi sembrano del tutto simili agli esemplari della medesima forma che si