

Diverse operaie raccolte a Sonador (Puerto Plata) su piante di Cacao, intente a cibarsi degli escrementi di Afidi (*Toxoptera aurantiae*, Boyer) che attaccavano i peduncoli florali di questa pianta; ottobre 1929.

Distribuzione geografica generale: Rep. di Haiti e Dominicana.

Strumigenys rogeri Em.

Strumigenys rogeri Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 22, p. 62, pl. 7, fig. 6, 1890.

» *rogeri* Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 24, p. 145, pl. 12, fig. 13, 1908.

» *rogeri* Emery, Gen. Insect. Myrmicinae, p. 322, 1922.

Un nido completo con operaie e femmine raccolte a Moca nel terreno sotto alla corteccia di una grossa radice di Saman (*Samanea saman* Britt.).

Distribuzione geografica generale: Cuba, Porto Rico, S. Thomas e R. Dominicana.

Cyphomyrmex rimosus ssp. minuta Mayr.

Cyphomyrmex minutus Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, vol. 12, p. 691, 1862.

» *steinheili* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. (2), vol. 20, p. 368, 1884.

» *rimosus ssp. minutus* Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 26, p. 225, 1894.

» *rimosus ssp. minutus* Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 21, p. 106, fig. N, O., 1905.

» *rimosus ssp. minuta* Emery, Gen. Insect. Myrmicinae, p. 342, 1922.

Parecchi esemplari raccolti in terreno collinare a Hato Mayor nella provincia del Seybo e un individuo di Moca raccolto sotto alla corteccia di una radice di Saman.

Distribuzione geografica generale: Florida, Antille e Venezuela.

Dorymyrmex pyramicus var. nigra Perg.

Dorymyrmex pyramicus var. niger, Pergande. Proc. Calif. Acad. Sc., vol. 5, ser. 2, p. 871, 1895.

» *pyramicus var. nigra* Emery, Gen. Insect. Dolichoderinae, p. 37, 1912.

» *pyramicus var. niger* Wheeler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 33, pag. 42, 1914.

Specie assai comune e raccolta a Moca, novembre 1927, giugno-agosto 1928; Pueblo Viejo (Azua), gennaio 1929; S. Pedro de Macoris e Hato Mayor (Seybo) maggio 1929.