


Lasiosoma minutissima nov. sp. (Tafel XXV, Figur 3.)

Mediastinalader vor der Mitte des Flügelvorderrandes in die Randader mündend, während die erste Längsader (Subkostalader) weit hinter der Flügelmitte sich mit der Randader vereinigt. Zweite Längsader (Radius) vor der Flügelspitze endigend. Randader über die Mündung der zweiten Längsader hinausgehend. Mittelzelle klein, viereckig; aus ihrer Mitte entspringt eine kleine Querader, welche sich mit der Mediastinalader verbindet. Dritte Längsader unmittelbar nach ihrem Vorsprung gegabelt. Vierte Längsader mit langer, weiter Gabel. Die Merkmale des Kopfes, des Rückenschildes und des Hinterleibes leider nicht erkennbar.



Figur 6. Schema von
Lasiosoma minutissima

Körperlänge 4 mm. Flügellänge 3 mm. Flügelbreite $1\frac{1}{4}$ mm.

Anmerkung: Im baltischen Bernstein hat sich eine ziemlich große Anzahl von *Mycetoptilidae Sciophilinae* vorgefunden¹⁾.

¹⁾ LOEW., H.: Über den Bernstein und die Bernsteinfauna. Meseritz 1850. — MEUNIER, F.: Monogr. des *Cecidomyiidae*, des *Sciaridae*, des *Mycetoptilidae* et des *Chironomidae* de l'ambre de la Baltique. Ann. Soc. Scient. de Bruxelles 1904 (Mémoire couronné).