

♂ de esta hormiga, que era hasta hoy desconocido, por lo cual doy más abajo su descripción.

»Hé aquí ahora la lista de especies:

Formica pratensis De Geer. ♀.

— *sanguinea* Latr. ♀.

Formica fusca L. ♀.

Lasius fuliginosus Latr. ♀.

— *niger* L. ♀ ♂.

— *flavus* De Geer. ♀ ♀.

Tetramorium caespitum L. ♀ ♀ ♂.

Leptothorax tuberum Fabr. ♀ ♂.

— — var. *unifasciatus* Latr. ♀.

Myrmica rugulosa Nyl. ♀ ♀ ♂.

Epitritus Baudueri Em. ♀ ♂.

»También merecen citarse como especies de la 'Coruña, y recogidas por el mismo Sr. Bolívar, la *Vespa rufa* L. ♀ y la *Mimesa bicolor* Jurine ♀.

Epitritus Baudueri Emery.

♂.—Cabeza negra, fuertemente punteada; mandíbulas de un pardo-claro; antenas pardas con el escapo corto y el primer artejo del funículo casi esférico. Tórax negro y rugoso por encima, rojo-oscuro por los lados. Peciolo pardo-rojizo, brillante. Patas de un pardo oscuro así como el abdomen, que es liso y brillante. Alas hialinas con las venas poco marcadas y provistas de una célula radial y otra cubital; estigma situado á la mitad de la distancia entre las porciones basilar y apical del ala. Algunos pelos cortos en el abdomen; el resto del cuerpo desprovisto de ellos; pubescencia nula. Long. 2 mm.»

Sesión del 6 de Abril de 1892.

PRESIDENCIA DE D. MÁXIMO LAGUNA.

—Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.

—El Sr. Secretario dió cuenta de una comunicación del Presidente y Bibliotecario de la Sociedad académica franco-