

á los moluscos marinos, saber con certeza todo lo conocido de España, y que así podrá en lo sucesivo el Sr. Calderón dar noticia de especies no citadas de Andalucía que figuran en las colecciones de la Universidad por él formadas.

—El Sr. **Medina** leyó la nota siguiente:

Formícidos de Pozuelo de Calatrava (Ciudad-Real).

«Nuestro diligente y activo consocio D. José María de la Fuente, presbítero en la localidad que encabeza esta nota, ha tenido la bondad de recoger y enviarme buen número de himenópteros de aquella comarca, de los cuales he podido estudiar hasta hoy los ejemplares referentes al grupo de los formícidos, entre los que he observado, aparte de las especies comunes en Andalucía y que allí abundan también visiblemente, algunas otras de verdadero interés, como lo demuestra la adjunta lista.

»Conocidas como son ya en esta Sociedad las excepcionales condiciones que adornan al Sr. La Fuente como hábil recolector, creo que pronto podremos apreciar sus trabajos entomológicos, que según mis noticias han de ser ciertamente interesantes. Asimismo deseo hacer público mi agradecimiento hacia dicho señor por su exquisita amabilidad para conmigo, dándose la molestia de abandonar sus estudios lepidopterológicos, para recoger los himenópteros que ha tenido la galantería de enviarme.

Camponotus micans Nyl. ♀

— *cruentatus* Latr. ♀

— *sylvaticus* Ol. ♀

— — var. *cognatus* Smith. ♀

— *Foreli* Emery. ♀

— *sp?* ♂ (ejemplar sin antenas).

Myrmecocystus viaticus Fabr. ♀

— *albicans* Roger. ♀

— — var. *viaticoides* André. ♀

— *sp?* ♂ (ejemplar malo).

Formica fusca L. ♀

— *rufibarbis* Fabr. ♀

— *subrufa* Roger. ♀

- Lasius niger* L. ♀ ♀ ♂
 — *flavus* De Geer. ♀
Plagiolepis pygmæa Latr. ♀
Tapinoma erraticum Latr. ♀ ♀ ♂
 — — var. *nigerrimum* Nyl. ♀ ♀
Tetramorium cæspitum L. ♀ ♀ ♂
Myrmica rugulosa Nyl. ♀
Aphænogaster barbara L. ♀ ♀ ♂
 — *rufo-testacea* Færst. ♀
 — *striola* Roger. ♀
 — *subterranea* Latr. ♀
 — *pallida* Nyl. ♀
 — *testaceo-pilosa* Lucas ♀ ♂
 — — var. *Fuentei* nov.

[31 Jan. 1893]

Dise. From Bolton

Sesión del
20 de Mayo 1892

»Color más claro que en el tipo, de un pardo amarillento en el tórax, antenas, mandíbulas, mejillas y primer artejo de los tarsos; un poco más oscuro en el resto de la cabeza y patas así como en el abdomen; espinas del metanoto cortas, agudas y casi horizontales. Todo el insecto mate y erizado de largos pelos blancos. Longitud 6 milímetros.

»De esta interesante variedad nueva solo he recibido un ejemplar del Sr. La Fuente, á quien la dedico gustoso.

- Pheidole pallidula* Nyl. ♀ 4 ♀ ♂
Solenopsis fugax Latr. ♂
 — *sp?* ♂
Cremastogaster scutellaris Ol. ♀ ♀ ♂
 — — var. *Auberti* Emery. ♀
 — *sordidula* Nyl. ♀

»Conforme vaya estudiando los ejemplares de himenópteros pertenecientes á otras familias, comunicaré los datos á la Sección.»

—El Sr. Calderón dió cuenta de un trabajo del Dr. Federico Sacco, titulado: *L'âge des formations ophiolitiques recentes*, inserto en el *Boletín* de la Sociedad belga de Geología, haciendo algunas observaciones sobre el mismo.

Notó que coincide el autor exactamente con los puntos de