

- Lasius niger* L. ♀ ♀ ♂
 — *flavus* De Geer. ♀
Plagiolipsis pygmæa Latr. ♀
Tapinoma erraticum Latr. ♀ ♀ ♂
 — — var. *nigerrimum* Nyl. ♀ ♀
Tetramorium cæspitum L. ♀ ♀ ♂
Myrmica rugulosa Nyl. ♀
Aphænogaster barbara L. ♀ ♀ ♂
 — *rufo-testacea* Færst. ♀
 — *striola* Roger. ♀
 — *subterranea* Latr. ♀
 — *pallida* Nyl. ♀
 — *testaceo-pilosa* Lucas ♀ ♂
 — — var. *Fuentei* nov.

[31 Jan. 1893]

Dise. From Bolton

Sesión del
20 de Mayo 1892

»Color más claro que en el tipo, de un pardo amarillento en el tórax, antenas, mandíbulas, mejillas y primer artejo de los tarsos; un poco más oscuro en el resto de la cabeza y patas así como en el abdomen; espinas del metanoto cortas, agudas y casi horizontales. Todo el insecto mate y erizado de largos pelos blancos. Longitud 6 milímetros.

»De esta interesante variedad nueva solo he recibido un ejemplar del Sr. La Fuente, á quien la dedico gustoso.

- Pheidole pallidula* Nyl. ♀ 4 ♀ ♂
Solenopsis fugax Latr. ♂
 — *sp?* ♂
Cremastogaster scutellaris Ol. ♀ ♀ ♂
 — — var. *Auberti* Emery. ♀
 — *sordidula* Nyl. ♀

»Conforme vaya estudiando los ejemplares de himenópteros pertenecientes á otras familias, comunicaré los datos á la Sección.»

—El Sr. Calderón dió cuenta de un trabajo del Dr. Federico Sacco, titulado: *L'âge des formations ophiolitiques recentes*, inserto en el *Boletín* de la Sociedad belga de Geología, haciendo algunas observaciones sobre el mismo.

Notó que coincide el autor exactamente con los puntos de