

- Formica longinoda LATR. *Hist. Four.* 1802, pag. 184.
 Formica macra GUÉR. *Voyag. Coq.* II. 1830, pag. 202.
 Formica zonata GUÉR. *Voyag. Coq.* II. 1830, pag. 205.
 Formica longipes JERD. *Ann. Mag. N. H.* 1854, pag. 105.
 Oecophylla longipes ROG. *Verz.* 1863, pag. 10.

In Africa, Asia meridionali et Australia.

Plagiolepis MAYR.

Europ. Formic. 1861, pag. 42.

27. *P. gracilipes* SMITH.

- Formica gracilipes SMITH *Cat. Brit. Mus.* 1858, pag. 22.
 Prenolepis gracilipes MAYR *Myrm. Stud.* 1862, pag. 50.
 Plagiolepis gracilipes MAYR *Adn. Mon. Form. Indo-Neerl.* 1867, pag. 41.
 Formica trifasciata SMITH *Cat. Brit. Mus.* 1858, pag. 27.
 Camponotus trifasciatus ROG. *Verz.* 1863, pag. 3.

In Hongkong, Singapore, Java, Celebes, Aru et Chili.

Hypoclinea MAYR.

Formic. austr. 1855, pag. 105.

- Monacis* ROG. *Ein. n. exot. Ameis. Gatt.* 1862, pag. 233.
Iridomyrmex MAYR, *Myrm. Stud.* 1862, pag. 54.

28. *H. cuspidata* SMITH.

- Polyrhachis cuspidatus* SMITH *Cat. Brit. Mus.* 1858, pag. 66.

29. *H. conigera* MAYR.

Neue Formic. 1870. pag. 18 (*Verh. zool. bot. Ges.* 1870, pag. 955).

Operaria: Long. 6-6.5 Millim. Ferrugineo-fusca, capite, scapo et abdomine nigro-fuscis; nuda, micans. Mandibulae nitidae, punctulatae; caput (cum mandibulis) cordiforme, subliliter coriaceum, partim subtilissime striolatum et insuper valde superficialiter foveolato-punctatum, margine postico ar-