

Myrmica cariniceps GUÉR. *Rev. Mag. Zool.* 2 Ser. T. IV. 1852, pag. 79.

Myrmica Kollari MAYR *Verh. z. b.* V. 1853, pag. 283.

Tetramorium Kollari MAYR *Form. austr.* 1855, pag. 153.

Myrmica reticulata SM. *Trans. ent. Soc.* 1862, pag. 33.

In Europae calcariis, in Africa, Asia meridionali, Australia et America meridionali.

Vollenhovia MAYR.

Reise d. öst. Freg. Novara, Form. 1865, pag. 21.

52. **V. punctatostriata** MAYR.

Reise d. öst. Freg. Novara, Form. 1865, pag. 21.

In Java.

Monomorium MAYR.

Form. austr. 1855, pag. 180.

53. **M. Pharaonis** LINNÉ.

Formica Pharaonis L. *Syst. Nat.* II. 1767, pag. 963.

Myrmica Pharaonis ROG. *Berl. ent. Z.* 1862, pag. 294.

Monomorium Pharaonis MAYR, *Myrm. Stud.* 1862, pag. 104.

Formica antiquensis F. *Ent. Syst.* II. 1793, pag. 357.

Myrmica domestica SHUCK. *Mag. Nat. Hist.* 1838, pag. 627.

Myrmica molesta SM. *Cat. Brit. Mus.* 1858, pag. 122.

Pheidole molesta ROG. *Berl. ent. Z.* 1859, pag. 259.

Diplorhoptum fugax LUCAS *Bull. Ann. Fr.* 1858, pag. LXXXI.

In Europae caldariis, in Africa, Asia meridionali, Australia, atque America centrali et meridionali.

54. **M. latinode** NOV. SPEC.

Operaria: Long. 2.9-3.7 Millim. Rufo-testacea aut castanea, antennis pedibusque testaceis, abdomine fusco-nigro; sparse longe pilosa, haud pubescens, pedibus pilis longis abstansibus. Laevis, nitidissima, mandibulis laevibus punctis non-