

magis, in op. min. minus constrictus, planitie metanoti basali subplana, circiter tam longa quam lata, antice rotundata, postice truncata, absque carina transversa et transeunte angulo rotundato in planitiem declivem, supra subverticalem; petiolus cum squama lenticulari, perpendiculari, antice modice convexa, postice plana, marginibus rotundatis.

Femina: Long. corp. 9.5 millim. Ferruginea, abdomine nigro, fronte cum vertice et thorace supra partim fuscis; pilositas et sculptura ut in operaria; clypeus et genae densissime reticulato-punctata punctis majoribus dispersis, ille margine antico bidentato; petioli squama rotundato-subquadrata, angulis rotundatis, latior quam altior, antice modice convexa, postice plana, margine superiore levissime emarginato; alae anticae subhyalinae, indistincte flavescens, pterostigmate et costis testaceis.

Diese Art hält die Mitte zwischen *Camp. lateralis* Ol. und *Sicheli* Mayr, indem das Metanotum des Arbeiters an der Grenze der Basal- und abschüssigen Fläche mehr abgerundet ist als bei *C. lateralis*, während diese beiden Flächen doch sehr deutlich unter einem stumpferen Winkel zusammenstossen als bei *C. Sicheli*, und auch die obere Hälfte der abschüssigen Fläche fast oder wirklich senkrecht ist. Die eingedrückte Pro-mesonotalnaht kommt bei den grossen Arbeitern dieser neuen Art ebenso wie bei jenen von *C. Sicheli* vor.

Vom Weibchen liegt mir nur ein einzelnes Exemplar vor.

II. PLAGIOLEPIS Mayr.

1. *Plagiolepis pygmaea* Latr.

Ess. Fourm. Fr. pag. 45.

III. LASIUS Fabr.

1. *Lasius niger* Linné.

Faun. Suec. Nr. 1723.

Von dieser Art liegt mir ein einziges Männchen vor.