

praecipue metathoracis lateribus, fuscescentibus, abdomine segmentorum margine postico fuscescente; sericeomicans, fere absque pilis abstantibus, clypeo margine antico serie pilorum longorum, mandibulis et palpis maxillaribus longe pilosis, thorace saepissime supra pilis nonnullis erectis; modice adpresse albo-pubescent, abdomine nudo; mandibulae subtilissime striatae, triangulares, margine masticatorio dentibus quinque, raro sex, fuscis, dente antico valido, acuto; caput rotundato-quadrangulare, distincte longius quam latius, subtilissime coriario-rugulosum, scapo gracili capitis marginem posticum longe superante; thorax indistincte subtilissime coriario-rugulosus, elongatus, pone medium haud fortiter depressus, metanoto elongato, haud fortiter gibbiformi; petiolus cum squama transversa modice incrassata, antice modice convexa, postice plana; abdomen subtilissime coriario-rugulosum; pedes longi et graciles.

*Mas*: Long. corp. 5.9 millim. Nigrofuscus, abdomine dimidio postico magis castaneo, mandibulis, antennis pedibusque albedo-testaceis; sparsissime abstante pilosus, clypeo serie marginali pilorum longorum; mandibulis, palpis maxillaribus et genitalibus pilosis, sparsissime, metanoto copiosius, adpresse albedo-pubescent, abdomine nudo; subtilissime coriario-rugulosus, nitens; mandibulae longitudinaliter striato-rugosae punctis nonnullis rudis, angustae margine masticatorio brevi, acuto, unidentato; petiolus cum squama erecta, quadrangulari, latiore quam altiore, marginibus rotundatis, margine superiore leviter arcuatim emarginato; alae anticae breves, abdominis apicem vix superantes, absque cellula discoidali clausa; segmentum abdominis ventrale apicale (hypopygium) postice ntrimque spina obtusa et dente (aut lobo) mediano obtuso; genitalium squamae longae laminiformes rectae, ad apicem obtusum extus unco triangulari magno.

Diese Art ist von *Cat. bombycina* Rog. (*Berl. ent. Zeit.* 1859, pag. 232), mit welcher sie die silberweisse anliegende Behaarung gemein