

hat längere Dornen, wie sie gewöhnlich jenem von *P. pusilla* zukommen.

XVII. SOLENOPSIS Westw.

1. *Solenopsis fugax* Latr.

Ess. Fourm. Fr. p. 46.

XVIII. CREMASTOGASTER Lund.

1. *Cremastogaster sordidula* Nyl.

Add. all. pag. 44.

Die meisten Arbeiter sind so wie die europäischen, nur ein Stück ist pechschwarz mit pechbrauner Basalhälfte des Hinterleibes und solchen Fühlern und Beinen.

2. *Cremastogaster subdentata* nov. spec.

Operaria: Long. corp. 3.3—3.8 millim. Nitida, testaceo-rufa aut castanea, abdominis dimidio postico, raro abdomine toto, nigro-fusco; pilosa, antennis pedibusque pilis haud longis, abstantibus; mandibulae fortiter striatae; caput laeve, genis et clypeo antice fortiter —, clypei lateribus et fronte levissime striatis, funiculi clava distincte biarticulata; thorax supra sublaevis, meso- et metathoracis lateribus carinis nonnullis longitudinalibus, mesonoto parum convexo lateribus longitrorsum striolatis, sutura meso-metanotali distinctissima absque carinis, metanoto inermi aut utrimque dente conico minuto retro directo, metanoti parte basali horizontali, nonnunquam striolata, parte declivi obliqua; petiolus sublaevis segmento antico deplanato, supra paulo concavo, trapezoideo, antice latiore quam postice, margine antico arcuato, segmento postico supra sulco forti longitudinali; abdomen subtilis sime coriaceo-rugulosum, antice sublaeve.

Femina: Long. corp. 8 millim. Nitidissima, testaceo-rufa, supra magis castaneo-rufa; pilosa, antennis pedibusque