

bidentato, inter partem basalem et declivem absque carina transversa; petioli squama magna, abdominis altitudine, paulo supra medium latissima et ibi utrinque dente minuto acuto instructo, margine superiore acuto et fortiter arcuato; abdomen subtiliter punctulato-coriarium.

*Femina*: Long. 7.5—8 mm. — Operariae colore, pubescentia, pilositate, sculptura atque capitis, petioli et abdominis forma simillima; pronoti spinulae ut in operaria; metanotum parte basali subhorizontali striata, postice vix bidentata, carina transversa nulla.

Mir liegen nur ein ♂ und ein ♀ aus Sumatra (Soepajang und Silago) vor, ein ♀ ohne Vaterlandsangabe besitze ich in meiner Sammlung.

Der Arbeiter ist jenem von *P. orsyllus* Smith ungemein ähnlich. Diese letztere Art hat aschgraue Pubescenz, einen breiteren Thorax, etwas längere Dörnchen am Pronotum, deutliche Zähne am Metanotum und eine scharfe Querkante zwischen diesen Zähnchen; die neue Art hat gelblichgraue Pubescenz, einen, besonders hinten, schmälere Thorax, das Metanotum ist undeutlich zweizählig und hat zwischen der Basal- und abschüssigen Fläche keine Querkante.

Es wäre möglich, dass sich nach Untersuchung eines reichlicheren Materiales diese Form besser als Race von *P. orsyllus* zu betrachten wäre.

Von Fred. Smith erhielt ich vor vielen Jahren 3 ♂ unter dem Namen *Polyrhachis orsyllus*, doch gehörten nur 2 Stücke aus Celebes zu dieser Art, während ein Stück aus Ceram einer neuen Art angehört die ich hier unter dem Namen

## 2. *Polyrhachis ceramensis*, nov. spec.

beschreibe.

*P. orsylo* Sm. simillima, major (6.5 mm.), spinis pronoti triplo longioribus, carina metanoti transversa fere nulla.