

Var. *cinerea* Mayr.—Jumel-Kuku-Gebirge, April 1884. Oase Tschyra-Sampoula, August 1885.

Insbesondere sind aber Mittelformen zwischen dieser und var. *rufibarbis* Fabr., nämlich *cinereo-rufibarbis* Forel, gesammelt worden.—1884: Mai-Juni, Tibet septentr.—1885: April, Tschertschen; Mai, Lob-Nor, Chotan, Russische Gebirge (7,000'—9,000'); Mai-Juni, Oasen Nia und Keria; September, Chotan (3.500').

**Myrmica tibetana** n. sp. operaria.

*Myrmicae laevinodi* Nyl. similis, sed antennae scapo paullo breviore, funiculo articulis  $4^{\circ}$ — $6^{\circ}$  crassitie longitudine aequalibus, partim paullo crassioribus quam longioribus, clava quadriarticulata, caput inter laminam frontalem et oculum rude reticulatum; mandibulae sexdentatae, dentibus 2 anterioribus majoribus; pronotum subtilius et magis reticulatim rugosum, mesonotum nitidulum et subtiliter ac superficialiter reticulatum, nonnunquam subtiliter striato-rugulosum, metanotum spinis 2 brevibus parum divergentibus, planicie basali aut laevigata aut longitudinaliter striolata, ad basim vero semper laevi et nitida, planicie declivi laevissima et nitidissima, partibus lateralibus plus minusve longitudinaliter striolatis et saepe partim subtiliter reticulato-punctatis aut coriaceis; petioli segmentum anticum ab articulatione antica ad nodi partem summam parum longitrorsum concavum, nodo subtiliter reticulato et minus rotundato, segmentum posticum nodiforme, latius quam longius, latera-liter subtiliter reticulatum, supra laevigatum et nitidum. Fuscenti-rufo-testacea, nonnunquam plus minusve fusco-testacea, capite, petioli nodo postico et abdome fuscis; modice abstante pilosa, pedibus antennarumque scapo copiosius et oblique abstante aut subadpresso pilosis, disperse pubescens.

April 1884, Jumel-Kuku-Gebirge; Mai-Juni 1884, Tibet septentr.