

findet sich vor der kleinen geglätteten und nur mit wenigen ziemlich groben Punkten besetzten Fläche des Scheitels ein kleines Punktauge. Das Pronotum beiderseits ohne oder mit undeutlichen Höckern. Ein Scutellum ist stets ausgebildet und auch eine Quersfurche (Naht) vom Mesonotum abgegrenzt; auch ist ein Postscutellum vorhanden. Die sehr deutlich quer-concave Basalfläche des Metanotum ist von den beiden Metanotum-Seiten durch je eine deutlich oder undeutlich crenulirte Längsleiste abgegrenzt. Das zweite Stielchenglied ist fast doppelt so breit als lang. Das erste Abdominalsegment ist oben ziemlich reichlich mit *vertieften, im Grunde flachen, kreisrunden*, oft haartragenden *Punkten* besetzt, zwischen den Punkten ist es glatt und glänzend, die folgenden Segmente sind dichter punktirt.

Von *P. diversus* JERD. und *P. affinis* JERD. sind die *kleinsten Arbeiter*, wie schon oben erwähnt, durch die abgerundet-rechtwinkligen Vorderecken des Pronotum leicht zu unterscheiden, die *grössten Arbeiter* sind von *P. affinis*, ausser der geringeren Grösse, besonders unterschieden durch die eigenthümliche Punktirung des ersten Hinterleibssegmentes, indem die runden Punkte scharf gerandet sind und einen flachen Boden haben; bei den *mittelgrossen Arbeitern* von *P. nanus* sind diese Punkte weniger zahlreich, bei *P. affinis* hingegen fehlen sie ganz oder sind sehr seicht. Von *P. diversus* unterscheiden sich die *grössten Arbeiter* von *P. nanus* durch die geringere Grösse, durch den Kopf, welcher sehr deutlich länger als breit ist (bei *diversus* ziemlich so lang als breit oder sogar etwas breiter als lang), durch den geglätteten Scheitelfleck, welcher klein und nicht so breit ist, wie die Entfernung der Stirnleisten an ihrem hinteren Ende von einander (bei *diversus* reicht er mehr oder weniger bis zu den Kopfseiten), ferner durch die Punktirung des ersten Abdominalsegmentes, welche bei *diversus* wohl ebenso ist, doch sind die Punkte viel kleiner; die *mittelgrossen Arbeiter* von *P. nanus* haben den geglätteten Scheitelfleck wenig breiter als er beim grossen Arbeiter ist, während bei den entsprechenden Exemplaren von *P. diversus* (sowie auch bei *P. affinis*) der ganze Scheitel glatt ist.

Kalawewa auf Ceylon (MADARÁSZ).

23. *Solenopsis geminata* FABR. — Singapur (BIRÓ).

24. *Triglyphothrix lanuginosus* MAYR. — Ceylon (MADARÁSZ).

25. *Tetramorium* (s. str.) *curvispinosum* nov. spec.

*Arbeiter*. — Körperlänge: 3.3 mm. Braunroth, Petiolus und Abdomen gelbroth, dieser vorne etwas heller, in der Mitte etwas gebräunt, die Mandibeln, Fühler und Beine gelb. Am ganzen Körper findet sich eine ziemlich lange, gelbe abstehende Behaarung. Die Oberkiefer sind dicht längsgestreift, Kopf und Thorax grob genetzt-längsgerunzelt mit glänzenden, ziemlich glatten, zwischen den Stirnleisten und den Augen fein genetzt-punktirten Maschen, der Clypeus ist nur längsgerunzelt, die Thoraxseiten