

***Cremastogaster schmidti* MAYR var. *laestrygon* EMERY.**

Bei Tadschura und in der nähern Umgebung der Stadt Tripolis.
Auch in Sicilien, Algerien, Tunesien und Syrien.

***Cremastogaster schmidti* MAYR var. *auberti* EMERY.**

Am Fuß des Dschebel T'kut, des höchsten Gipfels des Ghariangebirges, „auf einem Ölbaum, auf dessen Blättern Blattläuse saßen, welche von diesen Ameisen zahlreich besucht wurden“. Vom Nest ist keine Erwähnung gemacht. Ain Sarah.

Ist auch bekannt aus Süd-Frankreich, Spanien, Algerien und Ägypten.

***Tetramorium caespitum* L. var. *punicum* SMITH.**

Bei Dernah in Barka.

Außerdem bekannt aus Syrien. Ich sammelte diese Varietät bei Haifa in Palästina.

***Tetramorium caespitum* L. var. *inerme* MAYR —
semilaeve ANDRÉ.**

In der Umgebung der Stadt Tripolis.

Ich sammelte diese Zwischenform bei Zara in Dalmatien.

***Tapinoma erraticum* LTR. var. *nigerrimum* NYL.**

In der Umgebung von Tripolis, bei Dernah und Bengasi.

Sehr häufig in den Mittelmeerländern, auch in Persien und Turkestan.

***Bothriomyrmex meridionalis* ROG.**

Am Dschebel T'kut. Weibchen und Männchen am 18. September 1906.

Im südlichen Zentral-Europa, in den Mittelmeerländern, am Libanon und in Turkestan.

***Acantholepis frauenfeldi* MAYR.**

In Barka und zwar bei Dernah und Bengasi.

Überdies in Süd-Europa, Algerien, Tunesien, bei Aden, in Syrien und Persien.

***Myrmecocystus bicolor* FABR.**

In der Umgebung von Tripolis, in Gherran, Gharian (Hauptort des Gebirges), Bengasi und Dernah.