

UNIV. OF
Sur quelques insectes des lignites de l'Aquitaniën de Rott.
Sept Montagnes (Prusse rhénane)

PAR

FERNAND MEUNIER.

(Avec 22 Figures).

Dans des notes antérieures ¹⁾, je me suis occupé des feuillettes de lignites de Rott. Un nouveau contingent d'insectes de ce gisement tertiaire, qu'a bien voulu soumettre à mon examen M. Bauckhorn, de Siegburg, m'a permis de découvrir quelques nouvelles empreintes de cette formation et de compléter la description d'autres espèces, décrites naguère par von Heyden. Parmi les névroptères, *Libellula cellulosa* Hagen est une espèce très caractéristique.

Dans le monde des Homoptères, citons un Aphidide, *Schizoneura Patchi* nov. sp., bien reconnaissable aux veines des ailes. Des bestioles de cette famille n'ont pas encore été signalées de Rott. *Aphis delicatula* Heer a été trouvé sur les couches sannoisiennes d'Aix en Provence. Les genres *Aphis* et *Schizoneura* ne sont pas bien rares parmi les inclusions de l'ambre de la Baltique.

Les Coléoptères sont assez fréquents sur les schistes ligniteux de Rott. *Cossonus robustus* Meun. semble être très voisin de *Cleonus sexsulcatus* Heer des couches d'Aix. *Gonocephalum* (*Opatrum*) *pristinum* Heyden est une bonne espèce. Il en est de même d'une minuscule Staphylinide, *Stenus Scribei* Heyden.

Parmi les articulés supérieurs relatons deux Hyménoptères pour la faune des Sept Montagnes: *Formica Bauckhorni* Meun. et *Ponera*

¹⁾ Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. 67, Jahrgang 1915, Abhandlungen, Heft 3, ss. 205—217; Taf. XXI—XXV und 6 Textfiguren. Bd. 67, Jahrgang 1915; Abhandlungen, Heft 4, ss. 219—230, Taf. XXVI—XXVII, und 8 Textfiguren. Berlin. Jahrgang 1915.