

пальца 6-члениковая (дл. ихъ члениковъ въ μ : $32+40+80+80+72$). Губныя щупальца 4-члениковыя (дл. члениковъ въ μ : $24+16+36+48$). Mesonotum спереди очень выпуклый; профиль его сзади сливается по прямой линіи съ proscutellum'омъ. Scutellum также выпуклый. Покатая поверхность epinotum'a образуетъ съ основной очень плоскій закругленный уголъ. Узелокъ стебелька чуть шире задней и передней частей. Нуроругіумъ имѣетъ видъ, представленный на рисункѣ. На томъ же рисункѣ представлены и половые клапаны; они отличаются чрезвычайно малыми размѣрами; средний клапанъ построенъ чрезвычайно сложно, состоя изъ трехъ отростковъ. Проксимальный отростокъ расположенъ косо по отношенію къ медіальной плоскости; на рисункѣ онъ проэктированъ на эту послѣднюю. Голова и грудь тонко-морщинисты, съ многочисленными ямками, въ особенности первая; переднеспинка штриховатая, среднеспинка въ значительной степени сглаженная и довольно блестящая; эпинотумъ и стебелекъ грубо-морщинисты; брюшко очень нѣжно-морщинистое. Съ рѣдкими прилегающими волосками на тѣлѣ и почти безъ отстоящихъ, за исключеніемъ нижней поверхности брюшка. Чернаго цвѣта съ желтоватыми жвалами, рукоятью и первымъ членикомъ жгутика усиковъ, голенями, лапками и сочлененіями бедеръ. Крылья чуть коричневатыя съ желтовато-коричневыми жилками; съ одной дискондальной и одной кубитальной клѣточкой, почти вполнѣ раздѣленной продольной жилкой, продолжающейся и внѣ ея. Длина 4,5 мм.

Гадячь Полтавской губ., съ 28. VII по 9. VIII., Н. Книповичъ.

Tapinoma erraticum Latr.

Ирке-кашка Ферганск. обл., лѣто 1914, Б. Сварчевскій, множество ♂♂.

Leptothorax (subgen. *Leptothorax* Mayr-Ruz.) *nassonovi* Ruz.

♂. Длина головы составляетъ 1,2 ширины (по Рузскому³⁾, „почти квадратная“). Первый членикъ жгутика усика къ концу утолщенъ и равенъ по длинѣ 3 послѣдующимъ взятымъ вмѣстѣ + $\frac{1}{2}$ 4-го (по Рузскому, равенъ почти тремъ слѣдующимъ). Основанія шиповъ эпинотума сближены, такъ что въ промежуткѣ между ними получается непрерывная дуговидная линія. Шипы изогнуты дуговидно, какъ по направленію внизъ, такъ и внутрь; трехгранность ихъ сѣченія, которую я наблюдалъ у другихъ представителей этого рода, выражена слабо. Грудь неправильно-грубо-сѣтчато-морщинистая. Булава усиковъ, щеки, затылокъ и неясно отграниченная полоса сверху, соответственно задней половинѣ перваго членика брюшка,

³⁾ Муравьи Россіи, I, 1905.