

коричневатаго цвѣта. Въ остальномъ—сходень съ описаніемъ Рузскаго.

Муравей этотъ опредѣлень въ указанной работѣ Н. Книповича какъ *L. nassonovi* подъ сомнѣніемъ. Я нахожу, что сомнѣнія въ данномъ случаѣ быть не должно.

Окрестности Гадяча Полтавской губ., 11. VI. 09 и 22. VII. 09., Н. Книповичъ, нѣсколько♀♀. „Ползали по землѣ на сильно нагрѣваемомъ солнцемъ склонѣ“.

Leptothorax (subgen. *Leptothorax* Mayr-Ruz.) *tubерum* Fb. subsp. *knipovitshi* nova.

Муравьи этого сбора опредѣлены Н. Книповичемъ какъ *L. tubерum stipaceus* Ruz. (?). Это опредѣленіе я нахожу ошибочнымъ, такъ какъ форма и размѣръ шиповъ эпинотума совсѣмъ не соотвѣтствуютъ указываемымъ для этого подвида.

♀. Ширина головы составляетъ 2,3 длины; спереди она немного уже, бока почти прямолинейны, задніе углы сильно закруглены, затылочный край, при наблюденіи спереди, съ едва замѣтной выемкой; спинной профиль ровный, съ едва замѣтнымъ намекомъ на вдавленіе, обнаруживающимся при наблюденіи не сбоку, а сверху. Шипы эпинотума довольно длинные и тонкіе, равные по длинѣ по крайней мѣрѣ $\frac{2}{3}$ или $\frac{3}{4}$ основной поверхности всей заднеспинки или разстоянію между ихъ основаніями, при основаніи расширенные; они загнуты нѣсколько, какъ въ направленіи внизъ, такъ и внутрь; шипы трехгранные, при чемъ одна изъ граней, именно болѣе узкая, обращена вверхъ⁴⁾; при наблюденіи сверху у нѣкоторыхъ экземпляровъ верхняя грань обнаруживаетъ нѣсколько впереди середины длины шипа небольшое расширеніе; при наблюденіи сверху концы шиповъ закруглены, а при наблюденіи сбоку заострены; профиль шиповъ имѣеть такой видъ, какой представленъ Рузскимъ (Мур. Рос., I, стр. 592, рис. 140) для subsp. *kirillovi* Ruz.⁵⁾ Профиль перваго членика стебелька обнаруживаетъ вверху тупой уголъ, но задняя отлогая поверхность его не дуговидная, какъ у *kirillovi*, а обнаруживаетъ небольшой уступъ, благодаря чему вверху получается маленькая площадка; второй членикъ округленный, въ 1 $\frac{1}{2}$ раза шире перваго, спереди шире чѣмъ сзади. Жвалы съ двумя большими зубцами и нѣсколькими маленькими, различныхъ размѣровъ.

⁴⁾ Этотъ признакъ я наблюдаю также и у имѣющихся въ моей коллекціи *L. tubерum* Fb., *L. tubерum unifasciatus* Latr. и *L. (Mychothorax) muscorum* Ny l.

⁵⁾ Кстати укажу, что въ поясненіи рисунка этотъ муравей обозначень у Рузскаго какъ *Leptothorax affinis* subsp. *kirillovi*, тогда какъ въ дихотомической таблицѣ и въ заголовкѣ описанія онъ обозначень правильно какъ *L. tubерum kirillovi*.