

ная щупальца 6-члениковая, губная — 4-члениковая<sup>6)</sup>. Концы рукояти усиков достигает затылочного края. Переднегрудь расширена, с округленными боками. Впадина между mesonotum и metanoto-epinotum образует в профиль широкую полукруглую выемку, сзади более резко ограниченную; с боков она переходит в широко вдавленный шов. Шипы эпинотума довольно длинные, при основании широкие, острые, с концами чуть загнутыми внутрь. По бокам сочленения со стебельком — широкие округленные пластинки. Первый членик стебелька с довольно короткой передней частью; узелок его чуть шире передней части, при наблюдении в профиль, образует спереди слабо закругленный угол; снизу, у передней части членика, закругленный толстый сосочек. Второй членик узелка округленный, почти в 1½ раза шире первого. Голова довольно грубо-продольно-морщиниста, при чем в затылочной области и в особенности на задних углах морщинки переходят в сѣты; между лобными валиками, где морщинки наиболее сближены, их можно насчитать около 20; часть их неполной длины, извилистая; посрединѣ, благодаря соответствующим изгибам, лобные морщинки образуют узкую веретеновидную площадку; лобная площадка гладкая, блестящая; на тораксе продольные морщинки с более сглаженным гребнем. Переднеспинка морщинистая, при чем морщинки все таки обнаруживают преимущественно продольное расположение. Покатая поверхность эпинотума, между шипами, гладкая, блестящая, с едва выражен-




Рис. 2. *Leptothorax svartshevskii*, sp. n.

At — усик ♀, ♂ — торакс и стебелек ♀ в профиль, Md ♀ — жвалы ♀, ♀ — торакс и стебелек ♀ в профиль.

посрединѣ, благодаря соответствующим изгибам, лобные морщинки образуют узкую веретеновидную площадку; лобная площадка гладкая, блестящая; на тораксе продольные морщинки с более сглаженным гребнем. Переднеспинка морщинистая, при чем морщинки все таки обнаруживают преимущественно продольное расположение. Покатая поверхность эпинотума, между шипами, гладкая, блестящая, с едва выражен-

<sup>6)</sup> По Русскому (Мур. Рос., I, стр. 157), челюстные щупальца у представителей рода *Leptothorax* 5-члениковая, а губная 3-члениковая.