

ными поперечными морщинками. Членики стебелька неправильно-морщинистые. Жвалы продольно-морщинистая, съ точками у жующаго края. Волоски средней густоты, большей частью обыкновеннымъ образомъ заостренныя, остальные притупленныя. Низъ головы, усиковыя впадины, усики, жвалы, торакасъ и стебелекъ красновато-охристые, ноги болѣе желтоватыя. Верхъ головы и брюшко буровато-коричневаго цвѣта. Длина 4,25 мм.

♀. Длина головы, считая отъ передняго края личнаго щитка до затылочнаго края, составляетъ 1,2 ширины. Бока ея параллельныя, задніе углы сильно закруглены, но прямой затылочный край занимаетъ относительно гораздо большее протяженіе, чѣмъ у ♂, благодаря чему очертанія головы являются въ значительной степени прямоугольными. Жвалы съ 7—8 зубцами, изъ которыхъ два передніе болѣе длинныя. Метанотумъ ограниченъ двумя глубокими поперечными впадинами. Шипы эпинотума притупленныя, расходящіяся. Первый членикъ стебелька съ почти параллельными боками; его нижній сосочекъ направленъ нѣсколько назадъ и снабженъ на концѣ тонкимъ острымъ шипикомъ; второй членикъ стебелька болѣе или менѣе округленный, въ 1,7 раза шире перваго. Скульптура головы такая же какъ и у ♂; между лобными валиками точно такъ же можно насчитать около 20 морщинокъ. Веретенovidная фигура посреди лба имѣется налицо. Лобная площадка рѣзко отграниченная, вдавленная, гладкая. Морщинистость на торакасъ по преимуществу продольная, спереди нѣсколько переходящая въ сѣтчатую форму; наружный край морщинокъ болѣе или менѣе закругленъ. Крылья грязно-желтоватыя, съ кубитальной и дискоидальной клѣточками, изъ которыхъ первая спереди, почти до половины, раздѣлена продольной жилкой. Темно-коричневаго цвѣта; жвалы, усики, ноги, членики стебелька и передняя часть перваго сегмента брюшка желтоватыя; кромѣ того, у моихъ экземпляровъ, можетъ быть еще не вполнѣ окрашенныхъ, имѣется по желтоватому пятну снизу головы позади сочлененія со жвалами; такого же цвѣта трапецевидное пятно — соотвѣтственно срединѣ задней половины метанотума съ двумя рогами, направленными впередъ, передняя половина skutelluma, эпинотумъ и нѣсколько болѣе незначительныхъ пятнышекъ на груди. Въ остальномъ сходна съ ♀. Длина 5,5 мм.

Въ значительной степени напоминаетъ, имѣющій быть мною описаннымъ въ ближайшемъ будущемъ, *L. nevodovskii*, sp. n. (изъ Коджоръ, близъ Тифлиса) и вмѣстѣ съ послѣднимъ долженъ быть отнесенъ къ группѣ *nigritus* Em. - *semenovi* Ruiz.

Киргизъ-ата Ферганской обл., 10. VII. 14, Б. Сварчевскій, около 2 десятковъ ♂♂ и 4 крылатыхъ ♀♀.